






# Plan de Desarrollo para la Franja Horizontal de la Provincia Luis Calvo 1ra. FASE



DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO





**CARITAS CAMIRI** 

IH

81:81

SUA

Sud.



CSI




Plan de Desarrollo para la Franja Horizontal de la Provincia Luis Calvo 1ra. FASE



DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO





CARITAS CAMIRI 1995





Plan de Desarrollo para la Franja Horizonta de la Provincia Luis Calvo <sub>Ira.FASE</sub>



# SOCIORCONONHEO PORTION DE LA CONTROPORTION DE LA CONTROPIORI DE LA CONTROPIORI DEL CONTROPORTION DEL CONTR





CARITAS CAMIRI 1995

#### DIMENSION AMBIENTAL

AGRADECIMIENTOS O EXTENTO OPTOS

La elaboración del DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA FRANJA HORIZONTAL DE LA PROVINCIA LUIS CALVO DE CHUQUISACA, ha sido posible por la manifiesta confianza, generosa contribución o activa participación de personas e instituciones que han apoyado la inciativa tomada por Cáritas Camiri; por lo que con sinceridad manifestamos los siguientes agradecimientos:

A Catholic Relief Services (C.R.S.), por su oportuno aporte financiero. UP-OMA SHU MOIZMEMICI

A CORDECH, por el apoyo a través del esfuerzo de los técnicos del Programa de Desarrollo Agropecuario de Macharetí (P.D.A.M.); de la información proporcionada por el Departamento de Planificación y Recursos Naturales; y de la información para el manejo pecuario en la Llanura Chaqueña proporcionada por el personal del CIMBOC.

A CARITAS Boliviana, por su aporte para la publicación del presente estudio.

A CIPCA, TEKO GUARANI, A.P.G. DISTRITO SALUD Nº X - MACHARETI, SNC -VILLAMONTES, SECRETARIA REGIONAL DE SALUD - CHUQUISACA, SECRETARIA RE-GIONAL DE EDUCACION - CHUQUISACA, CARE, C.D.F. REGIONAL SUCRE, INSTITUTO DE COMPUTACION CAMIRI; por su contribución con información y apoyo solidario durante todo el proceso de nuestro trabajo.

A todos y cada uno de los habitantes de ésta zona, pues con hospitalidad nos han recibido en sus hogares y con paciencia han respondido a nuestras encuestas.

A las comunidades guaraníes, que a través de sus Mburubichas, representantes, delegados y la Asamblea del Pueblo Guaraní, que se presentaron, incluso en algunos casos caminando decenas de kilómetros a campo traviesa, para que al igual que las autoridades políticas, cívicas y religiosas, ser protagonistas de Talleres en los que se ha discutido la problemática regional.

Finalmente, un profundo agradecimiento a nuestro Obispo, quien como Vicario Apostólico de Cuevo y Presidente de Cáritas Camiri, condescendió para la realización de éste trabajo.

En nombre de todos y cada uno de los que trabajamos en Cáritas Camiri:

Gracias

Ing. Fernando Jiménez C.

DIRECTOR CARITAS CAMIRI

Julio Gorostiaga S.

Angel Rome

#### PERSONAL PARTICIPANTE:

DIRECTOR CARITAS CAMIRI COORDINADOR GENERAL

Fernando Jiménez C.

ACRADECIMIENTOS G. SOTIMIENTOS G. SO

#### **EQUIPO BASE:**

HISTORICO-ANTROPOLOGICO

La elaboración d.M agay obiuD CO SOCIOECONOMICO DE LA FRAJATINAIGNAMOIS/AMBIENTALA FRAJATINA MOIS/AMBIENTALA FRAJATINA DE LA F

DIMENSION ECONOMICA al rog aldizog obiz art. ADAZIUOUHO Oswaldo Antúnez O. DMIVO 99

contribución o activa participación de personas e institucion LA MOI SUTITA MINISMENTA MOI SU A MOI SU

por Cáritas Cam.M nedeta è solo sinceridad manifestamos los siguientes a ARAIJANAITA

DIMENSION SOCIOPOLITICA

DIMENSION URBANO-FUNCIONAL strongs onutrono uz roq. ( Sergio Terrazas G. A silodis ) A

Isabelle Combes

Carlos Crespo F.

#### A CORDECH, por el apoyo a través del esfuerzo de los técnicos del E SASOGRADOS

SALUD

**INFRAESTRUCTURA** 

VILLAMON', B CERTIFIT OIGHS A REGIONAL DE SALUD - CHUQUISACA, SECRI AGNAIVIV

GIONAL DE EDU SEMO I INOLUTION DE LA CARE, C.D.F. REGIONAL SUCRE AIMONO 3

FORESTAL

Planificación y Resaldos samotes: y de la información para el manejo pecuario en la Lla (NOI) ADUCIA

DOBMIO Norah Mengoa o abandinggo

Lorgio Pereira

A CARITAS I B sodma D nalra H porte para la publicación del presente estudio.

Fernando Jiménez C.

A CIPCA, TEK (oansld raso), A.P.G. DISTRITO SALUD Nº X - MACHARETI, SNC

DE COMPUTA nòznoM sèrbnA por su contribución con información y apoyo solidar JAT/IAIAMA

Guido Vega Moun eb osessora le

#### A todos y cada uno de los habitantes de ésta zona, pues con hospitali; OYOQA 3D JANOSR3Q

STRIA. ADMINISTRATIVA

A las comunidade agranda forenza de sus Mburubichas, representantes, delegad AIRARIA Sonia Forenza

del Pueblo Guar nòmid aibual Dataron, incluso en algunos casos caminando decenas AIRATAROAS

CONDUCTOR

Giovanna Pino C.

campo traviesa. T sodo olifosT que las autoridades políticas, cívicas y religiosas, ser protag OLUBIO

Talleres en los quana anna oinota la problemática regional.

#### Finalmente, un profundo agradecimiento a nuestro Obispo, quien como Vicari : SASONATA SANCA EL PROPERTO DE CARROLLO DE CARROLL

**SUPERVISOR** 

**ENCUESTADOR** 

**ENCUESTADOR ENCUESTADOR** 

**ENCUESTADOR** 

**ENCUESTADOR** 

**ENCUESTADOR ENCUESTADOR** 

**ENCUESTADOR** 

**ENCUESTADOR** 

ASESOR:

José Delgadillo

En nombre ,M orsugmA vnnholde los que trabajamos en Cáritas Camiri :

Pedro Zúñiga M.

Julio Gorostiaga S.

Angel Romero G.

José Trigo L.

René Maturano

Jesús Castillo

Ing. Fernando Jir añor U otrodo R

DIRECTOR CA Industrial Id

Miguel Rojas V.

#### INTRODUCCION

En el área de estudio, la población está conformada por guaraníes y criollos o karais, todos ellos conviviendo en un ambiente netamente rural donde comparten en grado y forma diferente una evidente situación de pobreza, la misma que no ha logrado cambiarse significativamente a pesar de los proyectos específicos que se ejecutaban en la zona como acciones aisladas e incoordinadas entre sí.

Cáritas Camiri, preocupada por esta realidad, toma la iniciativa de encarar un Plan para el Desarrollo Socioeconómico de ésta zona; el mismo que contempla dos etapas o fases consecutivas: Primero, la determinación del Diagnóstico Participativo, cuyos resultados sirvan de insumos básicos para la segunda fase consistente en la formulación y ejecución de Programas de Proyectos congruentes en tiempo y espacio.

El compartir con CORDECH (P.D.A.M.) ésta preocupación, como asímismo el desarrollo de acciones en un espacio territorial común, desembocó en la firma de un convenio entre CARITAS CAMIRI y el hasta ese entonces existente P.D.A.M., para la elaboración del presente DIAGNOSTICO; trabajo, que por las consideraciones expuestas precedentemente, posee las siguientes características:

Area territorial de estudio: La franja horizontal de la Provincia Luis Calvo de Chuquisaca.

Grupo humano objetivo: El universo de población que habita dicha área.

Objetivo del Diagnóstico: Se busca la identificación de las situaciones problema que constituyen los obstáculos que entorpecen el desarrollo del área en estudio; y también los potenciales susceptibles de ser utilizados precisamente para superar o atenuar aquellas situaciones problema.

- Metodología empleada: De la propuesta metodológica formulada por PROFIN-GTZ para una planificación de desarrollo regional, que genéricamente contiene tres grandes fases consecutivas; se asumió la primera, que es denominada "Diagnóstico Evaluativo de la Conformación Regional" y que está dividida en tres partes: la primera, denominada tendencia previa de desarrollo; es decir, la revisión de la historia de la región sujeto de estudio, con la intención expresa de diferenciar la génesis de las situaciones problema, en los diferentes hitos históricos característicos. Su objetivo metodológico es dar dirección a las siguientes partes del llamado diagnóstico evaluativo, pasando de una visión comprensiva anterior a una selectiva direccionada. La segunda, aproximación dimensional se orienta al análisis interpretativo de aquellas dimensiones ligadas estrechamente a los procesos de desarrollo. Finalmente, la tercera, aproximación interdimensional, es la recomposición metodológica de la comprensión integral de las situaciones problema, en donde se pretende vislumbrar la territorialidad y jurisdiccionalidad de los conflictos.

Las dimensiones consideradas son cinco : Ambiental, Económica, Sociopolítica, Administrativa-Institucional Fiscal-Financiera, y Urbano-Funcional.

Para concluir este trabajo, se han contrastado los resultados obtenidos por el equipo de técnicos-consultores, con los obtenidos de mesas-trabajo o talleres en los que participaron los actores sociales identificados en la zona, por lo que obviamente el resultado final obtenido pretende reflejar lo más apróximadamente posible una realidad.

El presente documento concluye señalando objetivos y estrategias por cada una de las dimensiones.

Tenemos la esperanza de que los datos que aquí se encuentren, puedan servir para la elaboración y ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo de ésta región.

Camiri, octubre 1.994

#### CONTENIDO

El Diagnóstico Socioeconómico, al que también hemos denominado DISE-Chaco, comprende seis volúmenes, cuyo contenido se resume en lo siguiente: que el presente en lo siguiente en lo siguiente

#### VOLUMEN I.

#### Cáritas Cámiri, preocupada por esta realidad, toma la iniciativa de encarar iOVITUJELE NAMUESA

Se describe en síntesis los aspectos más sobresalientes de las diferentes dimensiones del estudio y estrategias de desarrollo para el área.

#### El compartir con CORDECH (P.D.A.M.) ésta preocupación, como asímismo el desarrollo dell'ABMUJOV

#### MARCO HISTORICO-ANTROPOLOGICO cinera de un convenio por la firma de un convenio por la

Considera una visión histórica y antropológica de la región, su "geopolítica indígena", una reseña cronológica de los acontecimientos de la colonización y un panorama étnico contemporáneo.

Area territorial de estudio: La franja horizontal de la Provincia Luis Calvo de Chuquisaca.

#### **VOLUMEN III.**

#### DIMENSION AMBIENTAL

Considera la situación actual del medio ambiente en lo que respecta al área de estudio, sus problemas y potencialidades, análisis de las relaciones y procesos naturales; identificación de los factores de susceptibilidad, amenaza y riesgo ambiental y aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables y No Renovables.

# - Metodología empleada: De la propuesta metodológica formulada por PROFIN-GTZ para una <u>VI NAMUJOV</u> desarrollo regional, que genéricamente contiene tres grandes fases consecutiva ADIMONODA NOISNAMID

Contempla tres sectores : el agropecuario, industrial y el de infraestructura y servicios de apoyo a la producción. En ellos se encuentra la estratificación de la producción (agrícola, pecuaria), estructura de la producción, distribución, nivel tecnológico, proceso productivo, costos y beneficio, modelos de fincas agropecuarias, sistemas y redes de transporte e infraestructura productiva.

#### Finalmente, la tercera, aproximación interdimensional, es la recomposición metodológica de V NAMUJOV

#### integral de las situaciones problema, en donde se pretende vislumbrar la terr ADITION-OIDOS NOISNAMIO

Aborda 3 ámbitos de análisis : la estructura demográfica de la población, las condiciones materiales para su reproducción y la estructura de intereses sociales.

#### VOLUMEN VI.

#### DIMENSION ADM-INSTITUCIONAL FISCAL-FINANCIERA DIMENSION URBANO-FUNCIONAL

Contiene dos partes: La primera referida al análisis de las instituciones públicas y privadas para administrar, fiscalizar y financiar el desarrollo del área. La segunda parte contempla aspectos de la conformación espacial, de los asentamientos y su entorno; las relaciones con otros centros desde el punto de vista funcional, ejes de comunicación y clasificación vial, cronología de asentamientos y factores de desarticulación.

Camiri, octubre 1.994

#### **DIMENSION AMBIENTAL**

#### INTRODUCCIÓN.

La idea de poder seguir explotando continuamente nuestro ambiente finito para satisfacer a una población en constante expansión es claramente ingenua. Los avances tecnológicos no pueden ayudarnos mucho más. Igualmente cándida es la idea de que podemos volver a una vida idílica como cazadores y recolectores. Lo que tenemos que hacer para salvarnos es el problema más importante de este siglo. Creo que éste no puede resolverse sin un completo conocimiento de cómo hemos llegado a esta terrible situación.<sup>1</sup>

Hoy día es preocupación de la humanidad "el medio ambiente", se han organizado congresos, seminarios, talleres, cumbres ecológicas; sin embargo creemos que la conducta humana todavía no da respuesta a tan delicada situación.

Con el presente estudio queremos nosotros contribuir a hacer efectiva las políticas y estrategias de desarrollo para nuestra población, partiendo del conocimiento de la situación actual del medio ambiente en lo que respecta al área de estudio de sus problemas y potencialidades y único ecosistema de particulares características en la que se destaca, como especie endémica el Quebracho colorado en la formación del CHACO AMERICANO.

Los elementos que surgen como resultado de este análisis esperamos sirvan de herramienta útil a las instituciones involucradas en la planificación y desarrollo de la región.

#### 1. Objetivos específicos.

- 1.1. Analizar las relaciones y los procesos naturales de los componentes bióticos y abióticos, con los antrópicos, con el fin de establecer los diferentes grados de oferta ambiental.
- 1.2. Identificar los factores de susceptibilidad, amenaza y riesgo ambiental.
- 1.3. Identificar y analizar los condicionantes y limitantes para el aprovechamiento racional de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables.

MAPA Nº I DISE-CHACO

#### INTRODUCCIÓN

LUIS CALVO

DEL

AREA DE ESTUDIO

SUPERFICIE: 10.276 Km2

ARAGUAY

## UBICACION DEL AREA mente meste OIQUE ESTUDIO

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA FRANJA HORIZONTAL DE LA PROVINCIA LUIS CALVO

, seminarios, talleres.

nalmente

mos que

cumbres ecológicas; sin embargo creemos que la conducta humana todayía no da respuesta a tan delicada situación. Con el prese

ollo para

rópicos,

PUBLICA

210

220

OTOS

nuestra pobla de estudio de brachd destaca, com ANDO Los elemen involucradas 1. Objetivos Analizar E 1.2. Identific Trinidad 1.3. Identific Renovable Renovab LA PAZ SANTA CRUZ Santa Cruz 180 ORURO CHI Potosi 200

Tarija T ARIJA

REPUBLICA DE ARGENTINA

#### . Metodología.

Para lograr una visión aproximada de la problemática y potencialidades en el área de estudio en lo que se refiere a la Dimensión Ambiental, se ha recurrido a diferentes estudios localizados en la región, como también estudios generalizados del ecosistema CHACO que involucran el área objetivo. Esta información, más la obtenida en el DISE-Chaco en sus diferentes sectores de interés y situaciones de experiencia práctica, ha permitido establecer un análisis comparativo que se ha resumido en el presente capítulo ofreciendo información de sus diferentes temas componentes.

#### 3. Ubicación y extensión del área de estudio.

#### 3.1. Ubicación geográfica.

El área de estudio se encuentra al sudeste del país y del Departamento de Chuquisaca, formando parte de la región chaqueña del continente sudamericano <sup>2</sup> (Mapa Nº 1 y Nº 2). De acuerdo a las coordenadas geográficas se encuentra entre los grados 20\_ 20'46" y 21\_00' de latitud sur y 62\_ 25' y 63\_ 55' de longitud oeste.

#### 3.2. Extensión.

La extensión total de la provincia Luis Calvo tiene 12.700.80 Km<sub>2</sub>. En el área de estudio, que se ha definido como la "FRANJA HORIZONTAL" de la provincia, no se incluyen los cantones de Ticucha y Sapirangui, quedando definida una superficie de 10.276 Km<sub>2</sub>. (Ver mapa N° 2)

#### 3.3. Límites.

Este territorio tiene sus límites : al norte con la franja vertical de la misma provincia en el punto de la Hacienda Bella Vista y la provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, al sur con la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija; al este con la República del Paraguay y al oeste con la Provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca.


#### 3.4. División Político-Administrativa.

Administrativamente, el área de estudio, comprende once cantones cuyos nombres, en todos los casos, coincide con el de sus capitales (Ver cuadro Nº 1). Todos estos cantones fueron establecidos por C.C.L (Creación de Cantón según Ley) o por M.L. (Mención en Ley); excepto Bororigua que no tiene antecedente legal.

# CUADRO Nº 1 DISE - CHACO DIVISION GEOPOLITICA

CANTON	CAPITAL DE CANTON	SUPERFICIE/CANTON		
Iguembe	Iguembe	1.199,4		
Ivo	Ivo	274,9		
Huacaya	Huacaya	590,0		
Santa Rosa	Santa Rosa	182,0		
Boicobo Boicobo		122.,0		
Bororigua	Bororigua	205,9		
Carandaytí	Carandaytí	6.277,8		
Macharetí	Macharetí	527,9		
Ñancaroinza	Nancaroinza	530,6		
Tiguipa	Tiguipa	265,9		
Camatindi	Camatindi	100,0		
TOTAL SUPERFICIE	VINCIA HE	10.276,40		

Fu. nte : Censo INE. 1.992



#### Faja subandina, los estudios estratigráficos la tipifican por presentar sedimentitas de las enlarandos estratigráficos la tipifican por presentar sedimentitas de las enlarandos estratigráficos la tipifican por presentar sedimentitas de las enlarandos estratigráficos la tipifican por presentar sedimentitas de las enlarandos estratigráficos la tipifican por presentar sedimentitas de las enlarandos estratigráficos la tipifican por presentar sedimentitas de las enlarandos estratigráficos la tipifican por presentar sedimentitas de las enlarandos estratigráficos la tipifican por presentar sedimentitas de las enlarandos estratigráficos la tipifican por presentar sedimentitas de las enlarandos estratigráficos estratigráficos la tipifican por presentar sedimentitas de las enlarandos enlarandos estratigráficos en la tipifican por presentar sedimentitas de las enlarandos en la tipifican por presentar sedimentitas de la tipifican por presentar sedimentitas en la tipifican por presentar en la tipifican por presentar en la tipifican por presentar en la tipifica de la tipifican por presentar en la tipifican en la

En la descripción fisiográfica se consideran los materiales que yacen en la zona de estudio, la forma en que están estructurados, las geoformas o macropaisajes que han adquirido con los procesos y factores medioambientales de formación, incluido el hombre, a través del tiempo.

#### capas de areniscas desde silíceas hasta limosas y arcillosas, de diferentes granulometrías y tonalidaçãologia.

Los diferentes paisajes que se desarrollan en el área de estudio, han sido formados de acuerdo a la constitución litológica y su resistencia ante los procesos de erosión, de esta manera, las unidades de los complejos de tierra comprenden paisajes geomorfológicos cuyos componentes ambientales son más o menos uniformes"<sup>3</sup>.

#### 4.1.1. Formaciones Estratigráficas.

Las formaciones son conjuntos heterogéneos de capas sedimentarias estructuradas o no, depositados en un mismo lugar y durante un mismo tiempo. De estas formaciones han sido reconocidas un número de 30 en el área de estudio, los mismos que aparecen en el cuadro Nº 2. 2000 por sollo y sollo para en la constante de conocidas un número de 30 en el área de estudio, los mismos que aparecen en el cuadro Nº 2. 2000 por sollo y sollo para en la conocida de conocidas un número de 30 en el área de estudio, los mismos que aparecen en el cuadro Nº 2. 2000 por sollo y sollo para en la conocida de conocidas un número de 30 en el área de estudio, los mismos que aparecen en el cuadro Nº 2. 2000 por sollo y sollo para en la conocida de conocida d

# CUADRO N° 2 DISE - CHACO COLUMNA ESTRATIGRAFICA GENERALIZADA DEL AREA DE ESTUDIO

to y superficialmente	ERAS GEOLOGICAS	PERIODOS O	GRUPOS	FORMACIONES ESTRATIGRAFICAS
	CENOZOICA	Cuaternario		Depósitos aluviales Terrazas aluviales Dunas Depósitos coluvialuviales Depósitos coluviales Derrugbes
		Terciario	Grupo Chaco	Formación Guandacay Formación Tariquia
tí, Taiguati, Vertiente	aretí, Carandar	m a las de Mach	entre éstas se cita	Formación Yecua Formación Petaca
	MESOZOICA	Cretácico	Grupo Tacurú	Formación Ichoa Formación Castellón Formación Tapecua
ue se extendía desde	go anticlinal o	formaba un las	primitivamente	Formación basalto E. Rios
u faja culminal por la		Triácico UZ	Grupo Cuevo	Formación Ipaguazu Formación Vitiacua (sup.)
imente otras fracturu	PALEOZOICA	Pérmico Pold	currimiento de su	Formación Vitiacua (inf.)
	adro tectónico	Carbonífero	Grupo Mandiyuti	Formación San Anselmo Formación Escarment
rentemente a toda la agotado los empaje:			Grupo Zem sl Macharetí	Formación Taiguati Formación Chorro Formación Tarija Formación Itacuani Formación Itacuani Formación Itacua
		Devónico		Formación Iguiri Formación los monos Formación Huamanpampa Formación Icla

Fuente : CORDECH. Depto. RR.NN. 1.991.

En el anterior cuadro, se hace una representación estratigráfica, de abajo hacia arriba, desde las formaciones más antiguas hasta las más nuevas con sus épocas geológicas correspondientes. Como se puede observar, algunos nombres hacen alusión a lugares fuera de la zona de estudio, sin embargo, ello no ocurre, dichos nombres se deben a las localidades tipo para la unidad litoestratigráfica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Estudio integrado de los recursos naturales de Chaco Chuquisaqueño. Tomo 1. Introduccuón mmetodos y procedimientos. Resumenes CORDECH. Depto. R.R.N.N. Sucre - Bolivia. 1988 (Pag 6)

**Faja subandina**, los estudios estratigráficos la tipifican por presentar sedimentitas de las eras Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica, es decir, un cuadro estratigráfico bastante completo; mientras que, en el área de transición y en la llanura chaqueña, los sedimentos cuaternarios tienen una predominancia absoluta.

Area de transición, se halla conformada por sedimentos terciarios poco consolidados de horizontes conglomerádicos, capas de areniscas desde silíceas hasta limosas y arcillosas, de diferentes granulometrías y tonalidades y por sedimentos finos de arenas, limos y arcillas que representan el escape cuaternario.

**Llanura chaqueña**, se halla constituida, en su contexto total, por sedimentos cuaternarios de arcillas, limos y arenas, éstas últimas conforman un paisaje de dunas, unas consolidadas y otras en proceso de reactivación.

#### 4.1.2. Estructura Tectónica.

La faja subandina se caracteriza por estar conformada por anticlinales y sinclinales asimétricas y paralelos que topográficamente representan las serranías y los valles angostos y alargados con direcciones predominantes nortesur. En general el paisaje se caracteriza por tener un marcado control estructural y litológico sobre las formas del terreno.

4.1.1. Formaciones Estratigráficas.

El área comprendida entre la serranía del Aguaragüe y la gran falla regional de Carandaytí se considera de TRANSICIÓN, en la que los aspectos estructurales han sido mayormente determinados por secciones geofísicas.

Hacia el este de la falla de Carandaytí, la sísmica ha determinado pequeñas fallas de corrimiento y superficialmente sólo afloran sedimentos cuaternarios.

#### 4.1.3. Fallas Geológicas.

Las fallas principales tienen rumbo norte-sur, entre éstas se citan a las de Macharetí, Carandaytí, Taiguati, Vertiente y Vuelta Grande.

Con referencia a la serranía del Aguaragüe, primitivamente formaba un largo anticlinal que se extendía desde Tiguipa, en el Sur, hasta Itiyuro, en el norte; fue seccionado en su flanco oeste y próximo a su faja culminal por la falla del Aguaragüe, que determina un sobreescurrimiento de su bloque occidental y simultáneamente otras fracturas secundarias que determinaron en conjunto la formación de un complicado cuadro tectónico.

La gran falla de corrimiento Carandaytí, es la más prominente de la zona, intersecta aparentemente a toda la columna sedimentaria y parece ser que a través de su movimiento y plegamiento se han agotado los empujes provenientes del oeste.

#### 4.1.4. Movimientos Tectónicos.

En las eras geológicas se considera que existieron períodos de sedimentación tranquila, de deformación, de erosión y sin depositación, lo que se deduce por la presencia de discordancias, hiatos, transgresiones, etc.

Los movimientos tectónicos que dislocaron a los sedimentos de la formación Tariquia y a veces a la Formación Petaca, corresponden a las primeras manifestaciones del Ciclo Tectónico Andino, que le dieron a la Faja Subandina características de pliegues fuertemente comprimidos, que son los que se observan actualmente.

#### 4.1.5. Recursos Minerales.

No existen en el área de estudio; a excepción del Petróleo (hidrocarburos) y algo de yeso (sulfato de cal).

Minerales no metálicos. Los depósitos de minerales no metálicos hasta hoy prospectados se componen de yeso caliza y arcillas en volúmenes reducidos; excepto un yacimiento de yeso, de la variedad alabastro, que puede ser considerado como un potencial, ubicado entre Boicobo y Huacaya.

Entre los campos petroleros de mayor significado tenemos : Campo Camatindi, Porvenir y Vuelta Grande.

#### 4.2. Geomorfología.


El área de estudio comprende a los sistemas geomorfológicos de la faja subandina, del pie de monte o transición y de la llanura chaqueña (Ver mapa Nº 3). Es decir, tres superficies territoriales que se diferencian entre sí, en origen, estructura, relieve y evolución de paisaje. A su vez, estos sistemas comprenden unidades geomorfológicas que abarcan uno o varios complejos de tierra. Para una mejor comprensión a continuación definimos que es un sistema geomorfológico, una unidad geomorfológica y un complejo de tierra.

**Sistema Geomorfológico.** Es una superficie territorial con geoformas similares y sometido a los mismos procesos y factores medioambientales de evolución.

Unidad Geomorfológica. Es una parte de la superficie de un sistema geomorfológico que se diferencia por el proceso de su formación que puede ser de origen estructural, denudacional, coluvio-aluvial, aluvial y eólico.

Complejo de Tierra. Es una superficie territorial con una historia fisiográfica homogénea, cuyas características de relieve, suelos y vegetación son repetitivas.

Con el fin de brindar un enfoque global del tema y su posterior desarrollo, se presenta a continuación el cuadro Nº 3 sinóptico de la clasificación geomorfológica.



Unidad de origen estructural. Como se dijo, etc. "N ONGAUD fológica engloba a todo el sistema con sus doce complejos de tierra. En razón a que todo el pODAHD - BZIG marco básico geoformas de origen estructural originados por movimientos tectón CODIQUIGAS COMPANIENS SAMBITISMOS procesos ocurridos en el

s estre thos y sinclinales	SISTEMAS GEOMORFOLOGICOS	GEOMORFOLOGICOS	COMPLEJOS DE TIERRA	SUPERFICIE Km2	.as serranías, er nás amplios pe
	aja Subandina 5.47%	De origen estructural	Aguaragüe Caruruti	330.19	cañones).
. Tigati y Aguaragüe.	Iuacaya, Caipipendi	entayapi, Sararenda, I	Huacaya Ipepuco	423.06 169.46	intre las princip
		ınsición.	Itangua Itapu Itatique	222.91 224.76 186.07	1.2.2. Sistema (
ura chaqueña, por este			Milagros Palacios melzi		Como su nomb
ional, toluvio-aluvial y	estructural, denudac	norfológico como el	Urucurenda Igüipinta Cuevo	130.60 461.95 374.24	notivo presenta Iuvial.
	ona de ransición des 2	De origen estructuralobers	Arrozal	65.47	
	1 478	vel pie de monte de P	in del Amaragüe	ue, presenta tan des de la serran	onsecuencing os límites natur
ce complejos de tierra.	omorfológicas y on	De origen denudacional	Campo León Capirenda	258.37	iene una supert
S	ndantes.	e de los cantones cola	Carandaytí Ñancaroinza	181.97 233.14	Ocupa el occido
uerol priginados por la	nitas cuaternarias, fi	stituidos por sedimer	Salvador V. Grande	525.09 329.87	šste sistema cor
I O	intas de la Paja Suni	De origen coluvio-aluvial	Pinote	55.72	cumulación de
le tierra, el Arrozal, con	a un solo compleio c	De origen aluvial	Boyuibe Estación 199	37.651	U <mark>nidad de orig</mark> En este sistema,
		cantones de Machare	Macharetí Tiguipa	21.71 102.82	ma superficie d
		De origen aluvial	Achumal Algodonal	227.92 347.85	Unidad de orig
entidentally in universities	io siere combrehes or	al sistema. Comprend	Canada	342.72	
Vaneaminza, Machareti, ado del mismo nombre.		pa la parte oriental de undnytf, desde las inn	Las Moras Posada Santa Fe	126.53 126.53 279.29	
		0 - 2	Wirapitindi	440.43	
hicado al este de la fuja	morfológic <mark>o. Está u</mark>	De origen eólicom akas sabno	H. Villazón La Rosa	476.19 1.215.82	

Fuente: CORDECH. RR. NN. 1.991.

#### 4.2.1. Sistema Geomorfológico de la Faja Subandina.

Se halla constituido por una secuencia de paisajes de serranías altas, medias y bajas; colinas y pie de montes; terrazas aluviales y llanura aluvial, que manifiestan la confirmación de un completo complejo geomorfológico; no obstante, en este sistema prevalece el paisaje de origen estructural.

Tiene una superficie de 3.476 Km<sub>2</sub>, que se extiende de Este a Oeste desde el límite interprovincial Hernando Siles y Luis Calvo hasta la Serranía de Aguaragüe. Cubre la mayoría de los cantones localizados en la región occidental. El pico más alto se encuentra en la serranía del Aguaragüe a 1.600, m.s.n.m.. Se han identificado además 12 complejos de tierra y todo el sistema está comprendido dentro de la unidad geomorfológica de origen estructural.

Unidad de origen estructural. Como se dijo, esta unidad geomorfológica engloba a todo el sistema con sus doce complejos de tierra. En razón a que todo el paisaje tiene como marco básico geoformas de origen estructural originados por movimientos tectónicos de plegamientos, hundimientos, fallas y otros procesos ocurridos en el transcurso de las eras geológicas.

Las serranías, en general, se hallan orientadas en sentido norte-sur, conformando anticlinales estrechos y sinclinales más amplios por donde fluyen los ríos más importantes, constituyendo valles de pequeña a mediana amplitud (cañones).

Entre las principales serranías se citan a las de Tentayapi, Sararenda, Huacaya, Caipipendi, Ticuati y Aguaragüe.

#### 4.2.2. Sistema Geomorfológico del área de Transición.

Como su nombre indica, este sistema es una transición entre la faja subandina y la llanura chaqueña, por este motivo presenta paisajes de diferente origen geomorfológico como el estructural, denudacional, coluvio-aluvial y aluvial.

Consecuentemente, presenta también, un relieve variado, desde serranías hasta llanuras. Se encuentra situado entre los límites naturales de la serranía del Aguaragüe y el pie de monte de Pinote que surcan de norte a sur. Este sistema tiene una superficie de 2.119 Km<sub>2</sub>.; se identifican cuatro unidades geomorfológicas y once complejos de tierra. Ocupa el occidente del cantón Carandaytí y parte de los cantones colindantes.

Este sistema como el de la llanura chaqueña, constituidos por sedimentitas cuaternarias, fueron originados por la acumulación de sedimentos provenientes de la denudación de las serranías de la Faja Subandina.

#### Unidad de origen estructural.

En este sistema, la unidad de origen estructural comprende únicamente a un solo complejo de tierra, el Arrozal, con una superficie de 65.47 Km2. abarca parte de los cantones de Macharetí, Tiguipa y Camatindi.

#### Unidad de origen denudacional.

Esta es la unidad geomorfológica que caracteriza al sistema. Comprende siete complejos de tierra y la mayor parte de la superficie del sistema con 1.768.27 Km<sub>2</sub>. Ocupa la parte oriental de los cantones de Ivo, Nancaroinza, Macharetí, Tiguipa, Camatindi y la occidental del cantón Carandaytí, desde las inmediaciones del poblado del mismo nombre.

#### Unidad de origen coluvio-aluvial.

Únicamente el complejo de tierra Pinote corresponde a este origen geomorfológico. Está ubicado al este de la faja de transición y del pueblo de Carandaytí, hace de límite natural entre este sistema y la Llanura Chaqueña que surca de norte a sur a lo ancho del área de estudio con una superficie de 55.72 Km<sub>2</sub>.

Se trata de un terreno transicional del piedemonte a la llanura con pendientes que llegan, máximo a 1.5\_ y el único proceso que se observa es el de escurrimiento difuso y moderadamente concentrado. se nana conscituto par una aluvial, que manifiestan la confirmación de un completo complejo repuedad de la terrazas aluviales y llanura aluvial, que manifiestan la confirmación de un completo complejo repuedad de la terrazas aluviales y llanura aluvial.

Los complejos de tierras de Boyuibe, Macharetí, Estación y Tiguipa son de origen aluvial; ubicados el primero al norte en el límite y los restantes al sur en el límite intercantonal Macharetí-Carandaytí. En total, ocupan una y Luis Calvo hasta la Serranía de Aguaragüe. Cubre la mayoría de los cantones localizados en la cerron ocreticados.

El paisaje aluvial se caracteriza por estar conformado por depósitos de sedimentitas trasladadas en suspensión por la acción de escorrentía. Puede ser una llanura aluvial erosional (cjo. Boyuibe), una llanura aluvial temporalmente inundable (cjo. Estación), una llanura aluvial no inundable Tiguipa o unas terrazas aluviales y playas (cjo. Macharetí).

#### 4.2.3. Sistema Geomorfológico de la Llanura Chaqueña.

Todo el sistema se encuentra dentro del cantón Carandaytí y ocupa todo el este del área de estudio, desde las cercanías de la población de Carandaytí hasta los límites con la República del Paraguay. Este territorio es el verdadero Chaco. Tiene una topografía llana, con pequeñas ondulaciones hacia el este. Está constituido por las unidades geomorfológicas de la llanura antigua de origen aluvial y por la llanura de origen eólico.

#### Unidad de origen aluvial, llanura antigua.

Se trata de una unidad aluvial antigua que cubre una vasta superficie de 3.056 Km<sub>2</sub>., siete complejos de tierras fraccionado e intercalado entre sí y localizados al oeste del sistema (cjos. Achumal, Algodonal, Cañada, Las Moras, Posada, Santa Fe y Wirapitindi) su paisaje es el arquetipo de la llanura con algunas ondulaciones, ligeras depresiones, pisos de drenaje y ocasionalmente inundable. El relieve presenta diferencias hasta una amplitud de 12m. con pendientes de 0.5 a 5\_. La escorrentía difusa es uno de los pocos procesos perceptibles.

#### Unidad de origen eólico.

Los complejos de tierras Hito Villazón y La Rosa, conforman esta unidad geomorfológica con una superficie total de 1.692 Km<sub>2</sub>. ubicados al este del sistema hasta el límite con el Paraguay.

Su paisaje presenta un campo de dunas desarrolladas por la acción del viento, la escasa precipitación pluvial y el suelo compuesto de arenas finas.

Entre las características que tienen dichas dunas, se puede anotar amplitudes de la base a la cima de 4 a 12 m., flancos de 0.5 a 5\_ de pendiente y un único proceso dominante, la erosión eólica.

#### 4.3. Hidrografía.

La red hidrográfica del área de estudio está comprendida dentro de la cuenca subcontinental o macrocuenca La Plata, que a su vez está comprendida en la subcuenca del Río Pilcomayo y considerada en cuencas menores y microcuencas<sup>4</sup>.


Hecha esta consideración, el motivo del presente estudio lo constituyen las cuencas menores, que por el nivel de estudio serán denominadas simplemente como cuencas del área de estudio y las microcuencas con el nombre del río o la quebrada tributaria. A continuación presentamos un resumen de las diferentes cuencas expresado en el cuadro Nº 4.

4 CORDECH RR. NN. Tomo 2

308

4.2.3. Sistema Geomorfológico de la Llanura Chaqueña.

o, desde las ritorio es el uido por las	ARIOS PALES	raguay.	UPEA 5100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	SECO DO	DEL TIGRE	los límites	ıdaytí h <b>ğ</b> st	Cara	NTO MDI NO	RANTI OP IN	odo el sistema ercanías de la erdadero Chace
ritorio es el uido por las os de tierras		RIO RAIPIRENDA RIO BAYCUA RIO CARATINOI RIO TACUARANOI RIO BOYA	QDA. CHUNCHUPEA RIO ISANCA RIO SAUZALITO QDA. IMBOCHE	ODA. CARURUT ODA. CARON S	RIODA		RIO DE LOS PAL RIO TGURPA RIO TGURRENDA	810 810			ercanías de la erdadero Chace nidades geomo nidad de orige
	DRENAJE )	una ami	ias hasta erceptib	iferend cesos p	esenta d	El relieve p	inundable	ente	onaln	y ocas a 5 I	e trata de una da accionado e inte osada, Santa Fel isos de drenaje endientes de 0.
perficie tot pluvial y	Κm	į .			n el P&ra	sa, conforca	iistema Mas	IŠb	1.107	5.741.60	nidad de origios de complejos de 1.692 Kms. un paisaje preset
EICAS	AREA		el ab ac		no noto si	obsug oc onedo			as fin	TOTE SE	relo compuesto  ntre las caracta
CUADRO Nº 4 DISE - CHACO AS HIDROGRAI	PRINCIPAL	ntinenta				oceso domina				_ de pe	Irográfico de Bolivia.
CC nivel of nombre d	MICROCUENCA	RIO BAYCUA RIO CARURUTI RIO BOYA			RIO VITIACUA RIO TATI RIO ISIPOTE RIO YUMAO	DEL RIO CAIPIPAY DEL RIO CAIPIPENDI	RIO IGUARENDA RIO LOS PALACI	RIO DERECHA RIO DIABLO	comp	IGUAMIRANTI CARANDAYTI RAGUAPUA	como establece el mapa Hid
	CUENCAS MENORES	DEL RIO IGUEMBE	DEL RIO HUACAYA	DEL RIO CUEVO*	DEL RIO MACHARETI	OEL RIO CAIPIPENDI	DEL RIO TIGUIPA	DEL RIO CAMATINDI	INTERMEDIA	DE LA LLANURA	Fuente : CORDECH. RR.NN. 1.991 La cuenca menor del Río Cuevo, la hemos considerado tributaria de la cuenca del Río de La Plata,
	SUB CUENCA		LEO		X 1 0	000	Σ ∢ ≻ Ο				LNN. 1.991 o Cuevo, la hemos cons
TO STORY TO THE PARTY OF THE PA	MACRO CUENCA	D L	N I O	ОВ	AL	<b>⊅</b> ⊣ <b>⊅</b> ∟ ∆				and T. I.	Fuente : CORDECH. RR.NN. 1.991 La cuenca menor del Río Cuevo, la



De oeste a este se observa cuencas con ríos permanentes (Mapa Nº 4), que dada la topografía accidentada (faja subandina), predomina un drenaje destruccional de erosión sobre material rocoso consolidado. El trabajo de las aguas que fluyen es de modelación y de reducción de relieve (cuencas del Río Iguembe y Huacaya), sucede de igual manera con las cuencas de los Ríos Cuevo, Macharetí, Tiguipa, Camatindi y Caipipendi localizadas en el sector centro oriental del subandino.

En el área de Transición igual que en la Llanura Chaqueña; por el contrario, no existe ningún río, más bien se constituye en una cuenca baja de los ríos que descienden de la Faja Subandina, más propiamente de la serranía del Aguaragüe, por esta razón, el drenaje aquí resulta ser construccional o de deposición que forma extensos abanicos aluviales, pie de montes y la extensa Llanura Chaqueña con sedimentos de las serranías.

A esta Llanura Chaqueña se la considera como a la cuenca de la llanura.

Fuera de unas tres quebradas temporales, el drenaje en general es anárquico, mal integrado y sin uniformidad, su pendiente dominante se inclina suavemente hacia el sudeste.

Las cuencas de Iguembe y Huacaya son valles paralelos y alargados de norte a sur, conocidos también como cañones encajonados por las serranías de Abatiri, Tentayapi, Huacaya y Sararenda, ubicadas en los cantones del mismo nombre.

Los ríos de las cuencas del Iguembe, Caipipendi y Huacaya vierten sus aguas al río Pilcomayo, que además se constituyen en cabeceras. La cuenca Caipipendi lo conforma el río y la Serranía del mismo nombre y la del Aguaragüe, se encuentra ubicado en el límite que hace Huacaya con los cantones de Macharetí, Tiguipa y Camatindi.

Los ríos de las cuencas Cuevo, Macharetí, Tiguipa y Camatindi echan sus aguas al área de Transición en el pie de monte del Aguaragüe. Estos cuatro ríos tienen gradientes acentuadas en las nacientes, en correspondencia a la topografía abrupta, pero luego el mismo es moderado y posteriormente muy suave o casi imperceptible, cuando la trayectoria de estos ríos cursan el piedemonte y la parte llana donde se insumen a los pocos kilómetros.

Con referencia al material de arrastre, es grueso y algo heterogéneo en las nacientes de las cuencas, más fino y de poco material grueso a medida que la gradiente baja y finalmente en las desembocaduras donde el lecho es amplio y de pendiente mínima estos materiales son arenosos.

La cuenca del Río Macharetí, se constituye en la más importante por su ubicación geográfica y aporte de agua a la parte sur del área de transición. Esta cuenca tiene una parte alta que hace el acopio de las aguas pluviales en un área climática subhúmeda entre las serranías de Ticuati, Aguaragüe, Huacaya y Sararenda en la parte occidental de los cantones Ñancaroinza y Macharetí y lo transporta a la parte baja, ya mencionada, donde los recursos hídricos son en extremo limitados, dado que el clima es semiárido.

En años bastante lluviosos, las aguas de esta cuenca pueden llegar hasta el Río Pilcomayo; pero muy ocasionalmente y temporadas muy breves. Normalmente desaparece mucho antes en su trayecto por infiltración. Es posible que las aguas que se insumen y continúan una trayectoria subterránea y alimenten el curso del Río Pilcomayo.

Las cuencas del Tiguipa y Camatindi por su pequeña superficie y corto drenaje son consideradas como cuencas pequeñas de importancia secundaria, podría incluírselas en la Cuenca del Macharetí.

#### 4.4. Hidrología.

#### Escorrentía.

La escorrentía tiene una clara diferenciación en cuanto a su desarrollo en lo que es la zona de transición, de lo que es en el sector sub-andino.<sup>5</sup>

5 Esdudio Integradop de los recursos naturales del CHaco Chuquisaqueño (Area de transción) Tomo I, Pag 15); CORDECH; Depto de RR. NN 1988

También, el sector de transición no reúne condiciones favorables en su escorrentía, el curso de las aguas tienen carácter de intermitencia y que corren sólo en época lluviosa para insumirse en la llanura aluvial de deposición. La precipitación pluvial que se registra con una media anual de 767.5 mm. que va en descenso hacia el este, frente a valores de Evapotranspiración Potencial (E.V.P) mayores a la precipitación (960.2 mm); presenta el sector un déficit en la que la vegetación no encuentra condiciones óptimas de desarrollo; fuera de esto se anotan tasas altas de infiltración (20 cm/hora hasta 40 cm/hora).

El sistema hídrico mayor se presenta en el sector sub-andino con numerosos ríos de régimen permanente <sup>6</sup>, por tanto, la escorrentía presenta condiciones mucho más favorables para su desarrollo. Presenta también mayores precipitaciones (cerca a los 900 mm), una mayor humedad relativa, tasas de Evapotranspiración potencial menores como también menores valores de infiltración. El desarrollo de la vegetación manifiesta una mejor conformación y diversidad al encontrar un balance hídrico más equilibrado en el sector.

Finalmente tenemos el sector de la llanura aluvial chaqueña que muestra una escorrentía deficiente con valores bajos de precipitación, alta evaporación, igual infiltración y gradiente casi imperceptible<sup>7</sup>.

#### Caudales, mot apqueña solamente se han identificado las áreas con posibilidades de uso agrícola, tomesales de uso agrícola, tomesales de la langua d

Presentamos a continuación un cuadro de estimación de máximos caudales en las cuencas considerados dentro del área de estudio. La evaluación efectuada por el Departamento de R.R.N.N-CORDECH el año 1.992 de estos caudales, señala que están basados en algunos registros de aforos y en estimaciones de las descargas realizadas por métodos empíricos. (Cuadro Nº 5).

# CUADRO Nº 5 DISE - CHACO GAGLIBIZO MOD SAERA

#### ESTIMACION DE MAXIMOS CAUDALES DE LAS CUENCAS

8/5e			METODO DE GREAGER	METODO GRAFICO DE	FULLERY GREAGER(H3/SEG)
	2.4	CUENCAS MENORES	(M3/SEG)	TIEMPO DE RETORNO 10 AÑOS	TIEMPO DE RETORNO 100 AÑOS
29	S	Río Cuevo	1.528,4	800	1.300
15	В	Río Iguembe	1,865,3	1.100	1.650
45	A	Río Huacaya	2.305,0	1.300	2.000 PARETI
5	N	Río Caipipendi	1.326,9	720	1.200
18	D	Río Macharetí	2.017,6	1.300	2.010
3	1	Río Tiguipa	559,2	315	510
S N	Río Camatindi	474,4	17 275	OAPCA ODA. CARA	
	M PO IN ET E	Cuenca Intermedia	1213713	1.450	JATOT 2.200
ios	L SOI	Microcuenca Qda. Iguamiranti	1514,5		ooedr mayor detall superficies de riege
	NU	Microcuenca Qda. Carandaytí	1.298,0	700	oar!nente regable
	R	Microcuenca Qda. Naguapua	770,0	400	089

Fuente: CORDECH. RR.NN. 1.991.

<sup>6</sup> IBID Op. Cit

<sup>7</sup> Plan de desarrollo subregión V. Documento de trabajo número 2. Diagnostico evaluativo de la conformación subregional. CORDECH. 1993

#### También, el sector de transición no reúne condiciones favorables en su escorrentía, el curso de la zogaia 1.4.4.

El déficit biblico caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña debido a la caracteriza el área de estudio, situación que va agudizándose hacia la zona este o llanura chaqueña de la la la caracteriza el área de estudio a la caracteriza el área de estu

Las actividades agrícolas se desarrollan en los valles del sub-andino y pocos sectores del área de piedemonte y menos aún en la llanura chaqueña. En la mayoría de los casos y en especial en las áreas de tierras bajas estos cultivos son a secano, que sin duda conducen a una baja producción por bajos rendimientos y a riesgos de pérdida de suelos por erosión hídrica o eólica.

Para ello y con objeto de dar solución a los problemas de producción agrícola, se ha identificado todas las áreas de estudio, tomando en cuenta parámetros como pendientes permisibles para riego (por lo común que no sobrepase los 10 %), accesibilidad a los recursos hídricos y posiciones geomorfológicas a regar<sup>8</sup>. Así se ha delimitado todas las áreas con posibilidades de riego en el sub-andino y piedemonte. El estudio en referencia sigue señalando que, en la llanura chaqueña solamente se han identificado las áreas con posibilidades de uso agrícola, tomando como base la aptitud de los suelos (ver mapa N° 4).

Las áreas con posibilidades de riego y uso agrícola se muestran en el cuadro Nº 6. REED DES OUD BIEÑOS ASÍSDUAS

# CUADRO Nº 6 DISE - CHACO AREAS CON POSIBILIDADES DE RIEGO Y VOLUMEN MEDIO ANUAL APROVECHABLE PARA CADA CUENCA

		AREAS CON	VOLUMEN HEDIO APROVECHABLE			
CUENCAS MENOR	POSIBILIDADES RIEGO (Mas)	M3/Seg.	Lts/Seg.			
DEL RIO CUEVO		2680.0	1.70		1750	
DEL RIO IGUEMBE		1093.0	2.90	S	2905	
DEL RIO HUACAYA		894.2	4.30	U	4385	
DEL RIO CAIPIPENDI		8.0.0	1.50	8	1570	
DEL RIO MACHARETI		2360.0	4.50		4560	
DEL RIO TIGUIPA		920.0	0.30		365	
DEL RIO CAMATINDI		175.0	0.20	И	290	
INTERMEDIA		26530.0	1.50		1595	
DE LA LLANURA CHAQUEI	ÑA	317596.0				
MICROCUENCA QDA. IGUA	AMIRANTI	6000.0	0.30		325	
MICROCUENCA QDA. CAR	ANDAYTI	7940.0	0.20	1/1	225	
MICROCUENCA QDA. ÑAG	UAPUA	2010.0	0.09	0	90	
OS.S TOTAL		368198.2				

FUENTE: CORDECH.

Sin embargo en un estudio de mayor detalle se han definido para las cuencas de los ríos Macharetí, Tiguipa y Camatindi las siguientes superficies de riego:

Rio Macharetí area potencialmente regable de 6300 Has.

Suelos de clase II 1550 Has. (18 %)

Suelos de clase III 3910 Has. (62 %)

Suelos de clase IV 1260 Has. (120 %)

pero se toma en cuenta solo 5000 Has, netas de riego.

8 CORDECH RR. NN., Tomo IV; Cap 10 Edafología, Riegos

Para los ríos Tiguipa y Camatindi se establece 800 y 80 Has, respectivamente. Tues no no comunidad a allas de Son de Son de Camatindi se establece 800 y 80 Has, respectivamente.

Si bien indica este estudio una mayor incorporación de tierras para riego, en especial la referida al rio Macharetí de 5.000 Has. frente a 2.360 Has. señalada en el cuadro Nº 6; es importante considerar las posibilidades efectivas de volúmenes de agua para este propósito.

#### 4.5. Clima.

El clima tiene una influencia decisiva en el desarrollo y producción de cualquier especie vegetal o animal. Es un factor prácticamente establecido, al cual las investigaciones agrícolas y pecuarias deben estar condicionados.

De un modo general, los parámetros climáticos más importantes que caracterizan una región son temperatura y precipitación, que, a la vez, pueden ser expresados indirectamente de otras formas.

Así la estimación de evapotranspiración potencial está directamente ligada al factor térmico, siendo todavía posible la determinación de otros índices como : deficiencias y excedentes hídricos, índices hídricos, basados en estos dos elementos fundamentales.<sup>9</sup>.

La información de datos climatológicos con que cuenta el área son insuficientes, las estaciones de registros no cubren los requerimientos de la región. En el sector subandino, en la localidad de Muyupampa se halla la única estación termopluviométrica de este sector. En la zona de pie de monte o transición se encuentran dos estaciones termopluviométricas en Macharetí y El Salvador y una pluviométrica en Carandaytí, fuera de ello los registros con que se cuenta son discontínuos e incompletos. Las estaciones y sus características las presentamos en el cuadro Nº 7.

# CUADRO Nº 7 DISE - CHACO ESTACIONES CLIMATOLOGICAS

ESTACION	UBICACION	LATITUD LONGITUD ALTURA	ESTACION	INFORMACION DE	lipos climáticos
Muyupampa	Centro de Maíz (Luis Calvo)	19°52'10" 63°46'01" 1.170 m.s.n.m	Termopluvio métricas	15 años (1975/1989)	Janura aluvial Solo con datos pl Cemperatura mec
El Salvador.	Centro Zootécn ico (L. Calvo)	20°34'20" 63°44'15" 670 m.s.n.m	Termopluvio métrica	10 años (1975-'76-	recipitación me Balance Hídrico
Macharetí or unidad fisio	Villa Machare tí (L. Calvo)	20°48'49" 63°21'35" 660 m.s.n.m.	Termopluvio métricas	6 años (1986/1991) 1987-1990 Complejos	9 meses 2 meses A continuación, d
Carandaytí	(L. Calvo)	20°46'25" 63°07'00" 575 m.s.n.m.	Pluviométri cas	(1977/1989)	entre cada una l.5.1. Tipos Clin

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Anais Do Uno Simposio Sobre recursos Naturais e Socio Económicos do Pantanal (Pag 29). Rogerio Remo Alfonsi. Marcelo Bento Paez de Camargo

Se detalla a continuación un resumen hidrometereológico que ha sido extraído del Documento de Trabajo Nº 2 del Plan de Desarrollo para la Subregión V - CORDECH 1.993.

#### 5 000 Has. frente a 2.360 Has, señalada en el cuadro Nº 6: es importante considerar las posibilidades conbinados

Datos tomados de la única estación termopluviométrica de la zona ubicada en la localidad de Muyupampa, milos

Temperatura media anual

: 19,3 C

Precipitación media anual

: 791 mm.

El clima tiene una influencia decisiva en el desarrollo y producción de cualquier especie vegetal ozirbid sonala

: Enero a Abril

4 meses de excedencia De un modo general, los parámetros climáticos m oilul a royaM : ue caractomusnos de sesem 8n temperatura y

4 meses de déficit no la vez, que, a la vez, pueden ser expresendavol a Noviembre expresenda de déficit no la vez de ouras fortistates de déficit no la vez de companya de la vez de

1 mes de reposición

: Diciembre

Tipos Climáticos and acombina escillo. Húmedo y Subhúmedo a secono acombina escillo de la companion de la deferminación de la combinación de la combinación

#### Piedemonte o zona de Transición.

Datos de las estaciones termopluviométricas de Macharetí y el Salvador. 2001golo amilo 2016 de molos molos al

estación termopluviométrica de este sector. En la zona da 20, 18,15 : onte o transición se clauna aibam arutaraquesT

termopluviométricas en Macharett y El Salvador y una "mm 7,258 : a en Carandayit, fuelauna aibem nòiostiqioarq

que se cuenta son discontínuos e incompletos. Las estaciones y sus características las presentam opribid sonala

2 meses de excedencia 3 meses de consumo

: Marzo y abril : Mayo a Julio

4 meses de déficit

: Agosto a Noviembre

3 meses de reposición

: Diciembre a Febrero

Tipos	climáticos

30 091: Subhúmedo seco.

#### Llanura aluvial del Chaco.

Solo con datos pluviométricos de la estación de Carandaytí.

Temperatura media anual Precipitación media anual

: 559,9 mm.

Balance Hídrico

1 mes de consumo

: Febrero

9 meses de déficit

: Abril a Diciembre

2 meses de reposición


Enero a Marzo


A continuación, en los gráficos de balance hídrico y diagramas agroclimáticos, por unidad fisiográfica del área de estudio se puede apreciar las situaciones climáticas descritas y sus respectivas variaciones respecto a cada estación y entre cada una de ellas.

#### 4.5.1. Tipos Climáticos.

Los principales tipos climáticos clasificados a través de diferentes métodos se los señala en el mapa Nº 5, sin embargo lo consideramos como preliminar, debido a deficiencias ya señaladas referentes a registros y estaciones termopluviométricas.

# SUBANDINO BALANCE HIDRICO MUYUPAMPA







FUENTE : DPTO. RR.NN. CORDECH 1.991

# PIE DE MONTE BALANCE HIDRICO

#### GRAFICO Nº1

# MACHARETI






FUENTE : DPTO. RR.NN. CORDECH 1991


# PIE DE MONTE

GRAFICO Nº 4

# BALANCE HIDRICO

## EL SALVADOR







FUENTE: DPTO. RR.NN. CORDECH, 1991

# LLANURA CHAQUEÑA

# BALANCE HIDRICO

# CARANDAYTI






FUENTE : DPTO . RR. NN. CORDECH, 1.991

GRAFICON°5

# SUBANDINO

GRAFICO Nº 6

# DIAGRAMA AGROCLIMATICO MUYUPAMPA



ESTACION DE CRECIMIENTO NORMALAMANO STABILIDAD ESTACION DE CRECIMIENTO SON DE CRE

R	E	AF	E	R	E	N	C	1	A	S	
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--


O INICIO DE LLUVIAS Y DE LA ESTACION DE CRECIMIENTO	CRECIMIENTO
bi INICIO DEL PERIODO HUMEDO	EVAPOTR ANSPIRACION POTENCIAL (ETP
b2TERMINACION DEL PERIODO HUMEDO	OCEMUN COO.SER ( ETP. ) OLDANIMEET
C TERMINACION DE LA ESTACION DE LLUVIAS	VULL 30 HODA PRECIPITACION MARST

FUENTE : DPTO. RR.NN. CORDECH 1.991

# PIE DE MONTE

GRAFICON"5

### DIAGRAMA AGROCLIMATICO



ESTACION DE CRECIMIENTO NORMALA MAGNA OTMENDES ESTACION DE CRECIMIENTO NORMA D

#### REFERVE N C I A S

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 10 21 10 20 1
O INICIO DE LLUVIAS Y DE LA ESTACION DE CRECIMIENTO	TERMINACION DE LA ESTACION DE
bi INICIO DEL PERIODO HUMEDO	EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETP
b2 TERMINACION DEL PERIODO HUMEDO	- OSTAN - O.S. S. E. T.P. NOISAMMEST ST.
C TERMINACION DE LA ESTACION DE LLUVIA	PRECIPITACION


FUENTE : DPTO. RR.NN. CORDECH 1.991

0

bi.

# PIE DE MONTE DIAGRAMA AGROCLIMATICO

GRAFICO Nº8



ESTACION DE LA ESTACION DE CRECIMIENTO 206 DIAS


INICIO DE LLUVIAS Y DE LA	d TERMIN ACION DE LA ESTACION DE
ES TACION DE CRECIMIENTO	CRECIMIENTO HOLDAY 23
INICIO DEL PERIODO HUMEDO	EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETP.
TERMINACION DEL PERIODO HUMEDO	0.5 ( ETP.)

FUENTE : DPTO. RR,NN. CORDECH 1.991

TERMINACION DE LA ESTACION DE LLUVIAS \_\_\_\_\_ PRECIPITACION

# LLANURA CHAQUEÑA DIAGRAMA AGROCLIMATICO


GRAFICO Nº 7



DURACION DE LA ESTACION DE CRECIMIENTO: 154 DIAS ESTACION DE CRECIMIENTO NORMAL

	R	E	F	E	R	E	N	C	1	A	S		entrance and the
a 30 NO1	ES TACIO						<u>d.</u>			ACION D	ELAE	STACION	DE
b, JAISHS	INICIO D	EL PER	RIODO HU	MEDO				- 003E	VAPOT	RANSPI	RACION	POTENC	IAL (ET
b2	TERMINA	CION D	EL PER	RIODO HU	MEDO		MEDO	UH 000	5 (	ETP.)			b2
<u>c</u>	TERMIN	ACION	DE LA E	STACIO	N DE L	LUVIA	8 11 10	TACION	RECI	PITAC	ON		

FUENTE : DPTO, RR.NN. CORDECH 1.991



En consecuencia, las referencias climáticas que se tomaron por extrapolaciones y factores complementarios, son susceptibles de ser mejorados en la medida en que la infraestructura metereológica sea equipada. Como información incorporamos el cuadro Nº 8 la red de estaciones sugeridas por SENAMHI (SERVICIO NACIONAL DE HIDROMETEREOLOGIA). Por otro lado la zonificación de por sí se hace compleja, especialmente en la demarcación de algunos límites, por la variabilidad de las formas topográficas y los bruscos cambios de las mismas, así como por el cambio de la vegetación, poco perceptible a veces.

# CUADRO Nº 8 DISE - CHACO NUEVA RED DE ESTACIONES METEREOLOGICAS DE LA PROVINCIA LUIS CALVO

ESTACION	CANTON	ACCION	CARACTERISTICAS
HUYUPAMPA EL SALVADOR MACHARETI CUMANDAYTI TAPERILLAS TICUCHA CARANDAYTI RANCAROINZA SANTA ROSA VUELTA GRANDE TIGUIPA HDA. BELLA VISTA ALGODONAL HITO VILLAZON LOS LAPACHOS MONTE GRANDE HUACAYA CUENCA ALTA R.MACHARETI CUATRO VIENTOS	SAPIRANGUI CARANDAYTI MACHARETI TICUCHA TICUCHA CARANDAYTI RANCAROINZA SANTA ROSA CARANDAYTI CAHATINDI IGUEMBE CARANDAYTI CARANDAYTI CARANDAYTI CARANDAYTI CARANDAYTI CARANDAYTI CARANDAYTI CARANDAYTI TICUCHA HUACCAYA MACHARETI CARANDAYTI	COMPLEMENTACION A COMPLEMENTACION A COMPLEMENTACION A COMPLEMENTACION A REHAB. PLUVION. Y COMP. A REHAB. PLUVION. Y COMP. A REHABILITACION Y COMP. A REHABILITACION Y COMP. A REHABILITACION Y COMP. A CREACION	EST DE 10Y ORDEN EST. DE 10 ORDEN EST. DE 10 ORDEN EST. TERMOPLUVIOMETRICA EST. DE 10 ORDEN EST. DE 10 ORDEN EST. TERMOPLUVIOMETRICA EST. TERMOPLUVIOMETRICA EST. TERMOPLUVIOMETRICA

Fuente: RR. NN. Tomo II, Cap. IV.

COMPLEMENTACION A: Completar la dotación con artefactos modernos.

PRIMER ORDEN: Estación equipada con todos los artefactos que registran los fenómenos atmosféricos  $^{10}$ 

Clima Subhúmedo: Se tiene en el Subandino en las serranías que rodean la cuenca alta del Río Macharetí: Huacaya, Ticuati y Aguaragüe y la parte sur de esta última serranía, donde se encuentra el campo petrolero de Alto Camatindi y sirve de cabecera a los ríos de las pequeñas cuencas de Tiguipa y Camatindi.

Según las isoyetas, se tienen precipitaciones pluviales en torno a los 1.000 mm. El ambiente de sequedad en invierno y primavera es moderado particularmente en los lechos principales de las cuencas mencionadas y piedemontes. Estos últimos se constituyen en los mejores lugares para las prácticas agrícolas.

Su flora natural presenta un bosque ralo y un matorral poco espinoso algunas especies xerofíticas y algunos cactos columnares.

En el extremo noroccidental de esta zona (subandina), el clima se presenta más seco, debido a un régimen de menor precipitación pluvial, la estación de Muyupampa registra una media anual de 791 mm. (subhúmedo-seco).

Clima Semiárido: Este el clima característico del área de estudio, abarca casi todo el territorio, menos las cuencas altas de Macharetí, Tiguipa, Camatindi en la faja subandina y la llanura de las dunas en la frontera con el Chaco Paraguayo.

La sequedad del ambiente es evidente, los bajos porcentajes de humedad y la ninguna excedencia de agua, el déficit hídrico es total y va en aumento hacia el este. Si se observa las isoyetas (mapa N° 5), se ve que de 800 mm. en el piedemonte del Aguaragüe disminuye hasta 400 mm. en el extremo oriental. Las lluvias de verano son muy limitadas. Los inviernos y las primaveras son secas. La vegetación tiene un predominio de especies xerofíticas, de matorral bajo con apéndices espinosos y diferentes variedades de cactáceos. El porcentaje de árboles emergentes es pobre y subordinado.

10 CORDECH RR.NN., Tomo II, Cap 4

Clima árido: Se tiene en la parte oriental de la Llanura Chaqueña frontera con el Paraguay. Este territorio es conocido técnicamente como Llanura de las Dunas. Debido al déficit hídrico, la vegetación se reduce a un matorral de tamaño mediano, caducifolio y pajonales. En los lugares donde no existe cobertura vegetal las dunas se encuentran reactivadas por el viento, mil serveza nos sobrutoro y uma sobrutoro atransportante de la cura el serveza nos sobrutoros que el como en consecuente de la cura el serveza nos sobrutoros que el como en consecuente de la cura el serveza nos sobrutoros que el como en consecuente de la cura el como el como en consecuente de la cura el como el como en consecuente de la cura el como el co

Las vegetaciones son escasas y las temperaturas son extremadamente cálidas o frías, temperaturas contrastadas en las diferentes estaciones del año , en otoño (abril, junio y parte del invierno; marcada por temperaturas bajas debido a lloviznas y a vientos fríos provenientes del sur y veranos con lluvias torrenciales que se presentan a menudo durante esta estación acompañada de temperaturas elevadas en los meses de octubre a febrero.

#### 4.6. Suelos.

Los suelos del área de estudio presentan diversas características estructurales, con sus consiguientes aptitudes o capacidades de uso, definidos además por factores de topografía y de composición físico-químicos. Este recurso inicialmente y en su generalidad lo describimos a partir de los tres grandes paisajes que tenemos definidos en el área de estudio; de esta manera tenemos una primera caracterización.

#### Suelos del Subandino.

Este paisaje está caracterizado por un complejo de serranías que ocupa todo el sector, originando un relieve de pendientes fuertes a muy empinadas, lo que manifiesta condiciones de alta susceptibilidad de erosión hídrica de sus suelos. Por otra parte estos suelos tienen "poca profundidad efectiva e incipiente desarrollo pedogenético" 11. La suma de estos factores limita su aptitud o uso agrícola, pecuario o de aprovechamiento forestal, lo que la define como área de protección.

Los mejores lugares para prácticas agrícolas se encuentran en los valles o fondo de las cuencas, donde se encuentran formaciones de terrazas y piedemonte.

Cuenca del Río Iguembe Cuenca del Río Huacaya Cuenca del Río Cuevo Cuenca del Río Macharetí Cuenca del Río Caipipendi

#### Suelos del Area de Transición.

En su fisiografía presenta serranías bajas, colinosas y la llanura aluvial.

"Los suelos ubicados cerca al área de influencia del Río Macharetí son susceptibles a inundaciones estivales, influyendo notablemente en sus características físico-morfológicas y afectando su capacidad productiva. Estos suelos son muy profundos, generalmente con presencia de suelos enterrados resultado de diferentes depositaciones, acaecidas también en diferentes épocas. Las texturas son moderadamente gruesas arenoso-francosas a franco-arenosas y generalmente sin desarrollo pedogenético" 12

El paisaje de la llanura aluvial no inundable que ocupa gran parte de este sector, presenta suelos profundos con texturas medianas, con buen potencial agrícola especialmente los suelos ubicados al sur del área de estudio. Las colinas que rodean gran parte del área plana presentan un relieve con pendientes elevadas, susceptibles a la erosión hídrica, especialmente si son desprovistas de su vegetación, los suelos son muy profundos con moderado desarrollo pedogenético y buenas características físicas <sup>13</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Diagnóstico evaluativo de la Conformación surregional, documento de trabajo №2, CORDECH, 1993

<sup>12</sup> CORDECH RR. NN., Tomo I. 1991

<sup>13</sup> CORDECH RR. NN., Tomo I. 1991

Clima árido : Se tiene en la parte oriental de la Llanura Chaqueña frontera coañsupado arunal la ba solsura

La llanura chaqueña es una enorme cuenca rellenada por sedimentos de la Faja Subandina, proceso ocurrido en los diferentes períodos geológicos, que se halla diferenciada por dos paisajes : el de dunas y la llanura aluvial antigua; los suelos de ésta varían de moderadamente profundos a muy profundos con severas limitaciones climáticas. Se ha identificado suelos con posibilidades de uso agrícola con graves limitaciones de agua <sup>14</sup>.

Las vegetaciones son escasas y las temperaturas son extremadamente cálidas o frías, temperaturas contrastadas en

Las superficies de las dunas, cuyos suelos son profundos a muy profundos y pendientes moderadas. Debido al avance de las dunas en estas áreas, deberán dedicarse a la protección de la vegetación nativa y vida silvestre, lo que evitará una reactivación de las mismas. 15 no appropriencion de las mismas d

#### 4.6. Suelos.

Los suelos del área de estudio presentan diversas características estructurales, con sus consiguientes aptitudes o capacidades de uso, definidos además por factores de topografía y de composición físico-químicos. Este recurso inicialmente y en su generalidad lo describimos a partir de los tres grandes paisajes que tenemos definidos en el área de estudio; de esta manera tenemos una primera caracterización.

#### Suelos del Subandino

Este paisaje está caracterizado por un complejo de serranías que ocupa todo el sector, originando un relieve de pendientes fuertes a muy empinadas, lo que manifiesta condiciones de alta susceptibilidad de erosión hídrica de sus suelos. Por otra parte estos suelos tienen "poca profundidad efectiva e incipiente desarrollo pedogenético"<sup>11</sup>. La suma de estos factores limita su aptitud o uso agrícola, pecuario o de aprovechamiento forestal, lo que la define como área de protección.

Los mejores lugares para prácticas agrícolas se encuentran en los valles o fondo de las cuencas, donde se encuentran formaciones de terrazas y piedemonte.

Cuenca del Río Iguembe Cuenca del Río Huacaya Cuenca del Río Cuevo Cuenca del Río Macharetí Cuenca del Río Caipipendi

#### Suelos del Area de Transición.

En su fisiografía presenta serranías bajas, colinosas y la llanura aluvial.


"Los suelos ubicados cerca al área de influencia del Río Macharetí son susceptibles a inundaciones estivales, influyendo notablemente en sus características físico-morfológicas y afectando su capacidad productiva. Estos suelos son muy profundos, generalmente con presencia de suelos enterrados resultado de diferentes depositaciones, acaecidas también en diferentes épocas. Las texturas son moderadamente gruesas arenoso-francosas a francoarenosas y generalmente sin desarrollo pedogenético" 12

El paisaje de la llanura aluvial no inundable que ocupa gran parte de este sector, presenta suelos profundos con texturas medianas, con buen potencial agrícola especialmente los suelos ubicados al sur del área de estudio. Las colinas que rodean gran parte del área plana presentan un relieve con pendientes elevadas, susceptibles a la erosión hídrica, especialmente si son desprovistas de su vegetación, los suelos son muy profundos con moderado desarrollo pedogenético y buenas características lísicas 13.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> CORDECH, plan de desarrollo subregión V. 1993

<sup>12</sup> CORDECH RR. NN., Tomo I. 1991

<sup>3</sup> CORDECH RR NN Tomo I 199



El Departamento RR.NN. de CORDECH, ha efectuado un levantamiento de suelos a nivel de RECONOCIMIENTO, señalando que proporciona información de primer orden, que permite seleccionar áreas prioritarias o de mayor potencialidad agropecuaria, que merezcan estudios a niveles mas detallados.

Esto se plantea como una necesidad para lograr una planificación adecuada del desarrollo agropecuario y forestal del área de estudio; conociendo con la información obtenida la vocación de los suelos y así proporcionar las recomendaciones necesarias de un mejor manejo.

Por otra parte se señala que, "todas las unidades de suelos delimitadas coinciden con los límites de los complejos de tierra, puesto que en ambas unidades, el armazón básico es la forma de terreno, además de tener un alto grado de homogeneidad climática, geológica y de cobertura vegetal".

El cuadro Nº 9 muestra en detalle la clasificación por la capacidad de uso de los suelos en el área de estudio; la nomenclatura de la primera columna del cuadro, unidad de mapeo, corresponde a la identificación de los complejos de tierra elaborados en el mapa de suelos (Nº 6); confrontando este mapa con la tabla se localizan las clases y subclases de suelos con propósitos de definir su capacidad de uso en una primera propuesta de planificación para ello. La descripción de los suelos están realizados a nivel de levantamiento (reconocimiento).

El sistema utilizado en la clasificación está basado en el "Land Capability" del servicio de conservación de suelos del Departamento de Agricultura de los EE.UU., que se ha adecuado a las características regionales.

De esta manera para la clasificación por capacidad de uso tenemos:

Subclase: Que designa las principales limitaciones que afectan las clases agregándose a ellas las letras minúsculas e, w, s, c.

La subclase e: Estos son suelos en los que la erosión es el peligro dominante para su uso.

La subclase w: Estos suelos presentan exceso de agua lo que los constituye como riesgo o limitación dominante.

En general los criterios para determinar qué suelos pertenecen a esta subclase son: drenaje pobre, humedad excesiva, napa freática alta.

La subclase s: Tiene limitaciones del suelo dentro de la zona radical, incluye suelos que presentan poca profundidad, baja capacidad de retención de humedad, salinidad o alcalinidad y bajo nivel de fertilidad, difíciles de corregir.

La subclase c: De limitación climática; compuesta por suelos en los cuales el clima es la mayor limitación (Baja precipitación, alta evapotranspiración, etc.)

Clase: Es la categoría más alta en la clasificación de capacidad de uso, coloca todos los suelos en ocho clases de capacidad con un aumento progresivo en las limitaciones en cuanto al uso.

Referente al área de estudio, la clasificación de suelos por su capacidad de uso, presenta la siguiente composición:

CLASE	SUBCLASE
II	IIsc;IIesc;IIwsc
III	IIIs;IIIsc;IIIesc;IIIwsc
IV	IVc;IVec;IVsc;IVesc;IVwsc
V	Vsc;Vwsc
VI	VIesc
VII	VIIesc
VIII	VIIIesc

Descripción de las clases por capacidad de uso de los suelos. 16

<sup>16</sup> Extraido del Tomo IV, cap X. Edafologia y riego, RRNN-CORDECH

#### Clase II.

Esta clase se divide en las siguientes subclases : IIsc, IIesc y IIwsc. application de la morro de la companya de la companya

#### Subclase IIsc.

En vista de que estos suelos se hallan cubiertos en su mayor parte por la vegetación natural o nativa, deberá aplicarse a partir de la tercer cosecha fertilizantes en cantidades moderadas, según las necesidades y exigencias de cada cultivo, a modo de asegurar rendimientos óptimos en las cosechas.

El desarrollo de tierras para propósitos agrícolas no significa mayor problema por el tipo de vegetación existente y la topografía plana.

Ocupando por el tipo de vegetación existente y la topografía plana.

Ocupando por el tipo de vegetación existente y la topografía plana.

Cuando se realice el desmonte se deberá cuidar estos suelos contra la acción de la erosión eólica, donde el aumento de la velocidad del viento puede representar un peligro de importancia en su degradación. Para esto, será necesaria la protección mediante el sistema de cortinas rompevientos, implantadas cada cierta distancia.

Como conclusión final se puede decir que estos suelos son de una aceptable capacidad de uso, fáciles de trabajar y adaptables a toda clase de cultivos. La topografía plana permite también el uso de maquinaria agrícola. El mayor problema que presentan estos suelos es la baja fertilidad, especialmente en lo referente a sus elementos mayores (NPK). Otra limitante de importancia es el déficit de humedad edáfica debido a la irregularidad de la precipitación pluvial.

#### Subclase II esc.

Los suelos de esta subclase son apropiados para cualquier tipo de cultivo adaptado a las condiciones agroecológicas del medio. Presentan buenas características físicas. Los factores limitantes de importancia están referidos o relacionados con la erosión, suelos y déficit de humedad edáfico.

Debido a la presencia de pendientes suavemente inclinadas, se deberán emplear métodos de conservación adecuados y una adaptación cuidada de los mejores procedimientos para evitar la erosión.

Siendo esta clase apropiada para la agricultura, será muy importante también considerar los elementos nutritivos primarios y secundarios que los cultivos necesitan para un crecimiento normal; para lo cual se recomienda la incorporación de fertilizantes, previa experimentación de ensayos de fertilidad. Asimismo, será preciso implementar sistemas de cultivos, con rotaciones adecuadas e incorporación de abonos verdes para mantener la estructura de los suelos.

#### Subclase IIwsc.

Los suelos de esta Subclase poseen características físicas buenas, aptas para ser utilizadas en agricultura con cultivos adaptados a las condiciones de la zona.

La limitante de importancia está referida a la susceptibilidad, a las inundaciones estivales a que son sometidos estos suelos por las crecidas del río Macharetí, afectadas sus propiedades físicas; para esto se deberá implementar sistemas de control adecuados que eviten los desbordamientos del río.

Debido a que estos suelos tienen baja fertilidad, será preciso, cuando se implemente una agricultura intensiva, aplicar abonos orgánicos y de esta manera proporcionar a los cultivos los nutrientes requeridos para su buen desarrollo.

#### Clase III.

Esta clase incorpora las siguientes Subclases : IIIs; IIIsc; IIIesc y IIIwsc. lus estaciones en la siguientes Subclases : IIIs; IIIsc; IIIesc y IIIwsc. lus estaciones en la siguientes Subclases : IIIs; IIIsc; IIIesc y IIIwsc. lus estaciones en la siguientes Subclases : IIIs; IIIsc; IIIesc y IIIwsc. lus estaciones en la siguientes Subclases : IIIs; IIIsc; IIIesc y IIIwsc. lus estaciones en la siguientes Subclases : IIIs; IIIsc; IIIIsc; IIIsc; IIIesc y IIIwsc. lus estaciones en la siguientes Subclases : IIIs; IIIsc; IIIsc;

#### Subclase IIIs.

Estos suelos poseen riego y las limitantes se reducen a la zona radicular, como las texturas arenofrancosas y francoarenosas que determinan una baja capacidad de retención de humedad y humedad total aprovechable. Así también la fertilidad es baja y la reacción fuertemente alcalina.

Se puede practicar una agricultura semi-intensiva, aunque las técnicas de conservación son generalmente difíciles de aplicar y de mantener. Será preciso aplicar sistemas de rotación de cultivos gramíneas-leguminosas para elevar la fertilidad de los suelos, así como favorecer el desarrollo de una cubierta vegetal aplicando sobre la superficie del suelo residuos de plantas u otros materiales adecuados no producidos en el lugar del cultivo.

#### Subclase IIIsc.

Las limitaciones principales en orden de importancia son: falta de humedad en el perfil del suelo, drenaje interno deficiente y fertilidad baja a moderada. Cuando so contra la acciona el perfil del suelo, drenaje interno deficiente y fertilidad baja a moderada.

Estos suelos son aptos para cultivos de escarda, de la misma manera que en la anterior subclase (IIIs), se puede practicar una agricultura a secano con especies resistentes a la sequía y un manejo adecuado, como la rotación de cultivos, alternando cultivos anuales y leguminosas para pastoreo.

Así también se puede practicar una agricultura intensiva siempre que se suministre riego suplementario.

#### Subclase III esc.

En los suelos de esta subclase se pueden desarrollar adecuadamente todos los cultivos ecológicamente adaptados, pero aplicando métodos adecuados de conservación, como los cultivos siguiendo las curvas de nivel, rotación de cultivos, aplicación de abonos verdes.

Las medidas aconsejables para su manejo y conservación, radican principalmente en el incremento de la capacidad de retención de humedad, que puede corregirse a través de una abundante y permanente incorporación de materia orgánica al suelo, que puede ser por medio de abonos, verdes, rastrojos, etc.

#### Subclase IIIwsc.

Las limitaciones principales son emergentes, tanto de la baja fertilidad, como de la susceptibilidad a inundaciones estivales de los ríos principales.

Las prácticas de manejo son las mismas que las señaladas para la subclase IIIsc, enfatizando en la aplicación mucho mayor de residuos orgánicos, para mejorar la estructura del suelo. Así también se deberá planificar una rotación de cultivos, principalmente cuando sean utilizados en agricultura intensiva.

#### Clase IV.

Las subclases incorporadas en esta clase son : IVc; IVec; IVsc; IVesc y IVwsc. 200 92810/du2 8129 9b 201912 201

#### Subclase IVc.

Actualmente en estos suelos no se practica agricultura de secano, porque el factor limitante es la falta de agua, la misma que no está disponible en la zona. Por lo tanto se puede practicar una agricultura de secano en forma muy limitada, con especies resistentes a la sequía.

Actualmente en estas áreas se explica la ganadería extensiva, siendo la alimentación del ganado por sistema del ramoneo, la misma que puede ser mejorada con la implantación de pasturas mixtas (gramíneas-leguminosas), que se adaptan a las condiciones del medio, sin eliminar la vegetación natural en sus estratos superiores.

#### Subclase IVec.

Estos suelos poseen buenas características físicas, con texturas francas en todos los horizontes y fertilidad moderada a alta. Imitantes de la zona radicular son similantes d

Las principales limitaciones en estos suelos son : la falta de humedad en el perfil del suelo y la susceptibilidad a la erosión principalmente de tipo eólico.

Debido a que estos suelos son potenciales, será necesario realizar estudios a mayor detalle, de modo de obtener una información más exhaustiva de los límites entre las unidades de mapeo.

Posteriormente a este estudio detallado, se puede pensar en instalar un Centro de Investigación Fitotécnica, donde se investigue la introducción y adaptación de nuevas especies resistentes al déficit de humedad edáfica y mejoramiento de las especies nativas.

# acelerada. Su aptitud radica en el aprovechamiento restringido de la vegetación nativa, ya sea en pastosVI esaloduZ

Estos suelos son aptos para cultivos de escarda; se puede implementar una agricultura a secano muy extensiva y limitada a las especies resistentes a la sequía. En caso de implementar riego suplementario, deberá hacerse los correctivos de sus limitaciones, como la fertilidad y un manejo que permita mejorar la capacidad de retención de humedad.

#### Subclase IVesc.

Las principales limitaciones de estos suelos son: la falta de humedad en el perfil del suelo, la susceptibilidad a la erosión hídrica y problemas en la zona radicular, como la fertilidad baja, el drenaje rápido y la baja capacidad de retención de humedad.

Estos suelos son aptos para cultivos de escarda, por medio de una agricultura extensiva a secano, con especies seleccionadas, resistentes a la sequía. On o rigorno ob solicitib nos oup ani acroves yum conciscos marrilus colons

#### Subclase IVwsc.

Estos suelos presentan severas limitaciones debido a sus características texturales muy finas, que influyen en su drenaje interno. La permeabilidad es muy lenta y sus características físicas no son las adecuadas como para sostener una agricultura diversificada. Otro limitante de importancia, es la referida al peligro de inundaciones.

# escarpadas a muy escarpadas; profundidad del suelo muy superficial; alta susceptibilidad a la crosión .V saslO

Esta clase incorpora las siguientes subclases: Vsc y Vwsc.

# Por las limitaciones muy severas; estos suelos no son aptos para fines de agricultura, los mismos que d. 22V asalodu?

Corresponde a suelos con texturas muy livianas y en ciertos casos muy pesados que determinan una limitante de importancia que afecta su capacidad productiva.

Las limitaciones mayores están en la zona radicular del suelo ; es decir, sus texturas muy livianas, arenofrancosas; o muy pesadas, arcillosas, las primeras determinan suelos con baja capacidad de retención de humedad y como consecuencia son bajos en fertilidad, principalmente en nutrientes como el nitrógeno y fósforo.

En cambio el suelo con textura arcillosa, también limita el desarrollo radicular, principalmente en la dificultad en el movimiento interno del agua y los problemas de trabajabilidad.

Actualmente estos suelos son aptos solamente para pasturas y plantaciones forestales, cuyos rendimientos esperados, dependerán del manejo adecuado que se les de a estos suelos.

#### Subclase Vwsc.

Como limitante de importancia se tiene los diferentes grados de inundación a la cual son sometidos estos suelos, incidiendo de esta manera en sus propiedades físicas y químicas; las limitantes de la zona radicular son similares a los que se presenta en la subclase Vsc. Su utilización se restringe a pasturas y forestación.

#### Clase VI.

Esta clase divide la siguiente subclase : VIesc.

## Subclase VIesc.

Los suelos pertenecientes a estas subclases, tienen como limitación mayor sus pendientes elevadas, lo que hace que sean muy susceptibles a la erosión hídrica. Otra limitante de importancia es la presencia de grava y piedra, que impide un desarrollo radicular normal.

Las prácticas de manejo deben orientarse a la conservación de la vegetación nativa para evitar la erosión hídrica acelerada. Su aptitud radica en el aprovechamiento restringido de la vegetación nativa, ya sea en pastoreo extensivo, ramoneo o fines forestales en forma muy limitada. en el pastoreo extensivo de escadas se pastoreo extensivo de la vegetación nativa para evitar la erosión hídrica acelerada. Su aptitud radica en el aprovechamiento restringido de la vegetación nativa, ya sea en pastoreo extensivo, ramoneo o fines forestales en forma muy limitada. en el pastoreo extensivo, ramoneo o fines forestales en forma muy limitada.

# correctivos de sus limitaciones, como la fertilidad y un manejo que permita mejorar la capacidad de relIV sealO

Esta clase incluye la siguiente subclase : VII esc.

#### Subclase VIIesc.

Las limitaciones de mayor importancia en estos suelos son : las pendientes escarpadas, la susceptibilidad a la erosión hídrica por los factores topografía y texturas moderadamente livianas a medias en los horizontes superficiales; la fertilidad varía de baja a moderada. Por las características indicadas anteriormente estos suelos no son aptos para cultivos de escarda, por las severas limitaciones que presentan. En consecuencia estos suelos deben dedicarse a la ganadería extensiva, teniendo el cuidado de controlar la carga animal por unidad de superficie; caso contrario estos suelos sufrirán erosiones muy severas las que son difíciles de corregir o recuperar.

#### Clase VIII.

La subclase perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamil severas fimiliarios perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamiliario perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamiliario perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamiliario perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamiliario perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamiliario perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamiliario perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamiliario perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamiliario perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamiliario perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamiliario perteneciente a esta clase es : subclase VIIIesc. a obidob sonoicamiliario perteneciente a esta clase es : subclase viente es : subclase viente

# una agricultura diversificada. Otro limitante de importancia, es la referida al peligro de inunda, sellIV esclude

Estos suelos tienen limitaciones muy severas, tales como : Topografía compleja; es decir, presentan pendientes escarpadas a muy escarpadas; profundidad del suelo muy superficial; alta susceptibilidad a la erosión hídrica o eólica, etc.

Por las limitaciones muy severas; estos suelos no son aptos para fines de agricultura, los mismos que deben dedicarse a la recreación o vida silvestre, evitando las quemas de vegetación nativa, tala de la vegetación y pastoreo no controlado.

Las limitaciones mayores están en la zona radicular del suelo; es decir, sus texturas muy livianas, arenofrancosas; o muy pesadas, arcillosas, las primeras determinan suelos con baja capacidad de retención de humedad y como consecuencia son bajos en fertilidad, principalmente en nutrientes como el nitrógeno y fósforo. En cambio el suelo con textura arcillosa, también limita el desarrollo radicular, principalmente en la dificultad en el movimiento interno del agua y los problemas de trabajabilidad.

Actualmente estos suelos son aptos solamente para pasturas y plantaciones forestales, cuyos rendimientos esperados, dependerán del manejo adecuado que se les de a estos suelos.

## CUADRO Nº 9 DISE - CHACO

# CLASIFICACION POR CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS idolores (Bombax sp.) Oroche (Bombax sp.)

Palo Blanco (Calycophyllum (SOLJJUS 30 6 or APAM JAG SAIS/NATARA)

NIDAD TIERRAS
APEO CONSTITUYEN
Milagros  Aquarague  2.12 Itatique  2.13 Pelacios  1.14 Urucurenda  2.15 Iguipinta  2.7 Caruruti  2.8 Itangua  3.9 Itapu  1.1 Huacaya  2.2 Ipepuco  2.3 Cuevo  2.1 Arrozal  2.2 Capirenda  Anrozal  2.2 Capirenda  Ancaroinza  3 Rencaroinza  5 Vuelta Grande  Estación  7 Tiguipa  4 Macharetí  2.1 Pinote  2.2 Campo León  2.3 Rencaroinza  3 Rencaroinza  4 Salvador  5 Vuelta Grande  Estación  7 Tiguipa  8 Macharetí  2.1 Pinote  2.2 Campo León  2.3 Rencaroinza  3 Rencaroinza  4 Salvador  5 Vuelta Grande  Estación  7 Liguipa  8 Macharetí  2.1 Pinote  2.2 Campo León  2.3 Rencaroinza  3 Rencaroinza  4 Las Moras  Posada  5 Santa Fe  Wirapitindi

Subhumedo, ésta unidad es la menos representativa en la faja subandina ocupa unajen, nn. nn hadno: sinera ma. o sca

# 4.7. Vegetación y uso actual del suelo. El sue la vegeta la vegeta del suelo entre los 1.320 a 1.590 m.s.n.m., con pendientes pronunciadas: la vegeta con la vegeta del suelo.

Fisiográficamente se han establecido tres paisajes que se definen en el punto 1.4.2. (Geomorfología) como ; la zona subandina, piedemonte o transición y la llanura aluvial chaqueña (ver mapa Nº 3), los tres paisajes suman una superficie de 10.276 Km² que comprende el total del área de estudio.

#### Subandino.

En la faja subandina que ocupa el 35.47 % de la superficie del área, se establecieron las siguientes unidades : (ver mapa N° 5).

**Subhúmedo** a húmedo, que abarca una superficie de 1.575 Km<sub>2</sub>. tiene un rango de precipitación de 800 a 1.000 mm. anuales, la temperatura media anual es de 21\_ a 23\_C, su altitud va desde los 700 a 1.570 m.s.n.m., y pendientes de 30\_ a 70\_, la vegetación presenta diferentes composiciones en relación altitudinal o microclimática. Las especies identificadas son las siguientes:

#### Estrato Arbóreo.

Cebil (Anadenanthera macrocarpa)
Urundel (Astronium urundeuva)
Lapacho rosado (Tabebuia ipe)
Lapacho amarillo (Tabebuia excelsa)
Palo sapallo (Pisonia zapallo)
Orco quebracho (Schicnopsis haenkeana)

Tipa (Tipuana sp)

Laurel (Nectandra sp)

CLASIFICACION POR CAPACIDAD DE US (muupilissitrotnos muidoloratn3) vodmiT

Oroche (Bombax sp)

(REFERENCIAS DEL MAPA Nº 6 D(murolfitlum mullydqo2yla)) oonald olaq

Cedro (	Cedrel	la sp)
Court	CCUICI	ILL OFF

N3			UNIDAD
8			MAPEO
		Αρμεταφύν	
	102.40	Urucaranda Iquipinta	5.2.14
			5.3.7
			9.0.8
	169.46		5.4.2
		Capirenda Wencaroinza	
92.0		Eptación	0.1.4
0.44	\$5.72	Pinote	1.2.0
		Campo León	
		Boyulbe	
		Achuesl	
	691.76	Les Nores	4.1.1
		Popula	
		ibalijagaiN	1.1.3
		norallly offe	
	2.25 2.25 2.25 2.25 2.27 2.27 2.27 2.27	Km2 \$2.94 500.81 \$3.94 186.07 11.47 192.40 11.47 192.40 11.47 202.91 11.47 222.91 11.75 228.76 11.77 228.76 11.77 228.76 11.77 228.76 11.77 229.93 11.39 239.93 11.39 239.93 11.39 239.93 11.39 239.93 11.39 239.93 11.39 239.93 11.39 239.93 11.39 239.93 11.39 239.93 11.39 239.93 239.93 239.93 11.39 239.93 239.93 239.93 11.39 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 237.65 0.30	TIERRAS   Km2   S.00   S.00

Subhúmedo, ésta unidad es la menos representativa en la faja subandina ocupa una superficie de 186 Km2. o sea el 5.35 %. La precipitación es de 900 a 1.000 mm. anuales; la temperatura media anual es de 22\_C, la altitud oscila entre los 1.320 a 1.590 m.s.n.m., con pendientes pronunciadas; la vegetación identificada presenta las siguientes especies:

zona subandina, piedemonte o transición y la llanura aluvial chaqueña (ver mapa Nº 3), los tres consòdrA otarta

Cuchi (Astronium urundeuva)

Timboy (Enterolobium contortissiliquum)

Quina (Miroxylum sp)

En la faja subandina que ocupa el 35.47 % de la superficie del área, se establecieron las (qs aradnanabanA) lideO

Palo zapallo (Pisonia zapallo)

Pacacay (Inga sp)

Subhúmedo a húmedo, que abarca una superficie de 1.575 Kms tiene (anashash sisqonidos) odradaup con Orco quebracho (Schinosta de la 1.575 Kms tiene (anashash sisqonidos) odradaup con Orco quebracho (anashash sisqual de la 1.575 Kms tiene (anashas

mm. anuales, la temperatura media anual es de 21\_a 23\_C, su altitud va desde los 700 a 1.57 (qs aiudədaT) odaqaL

de 30\_ a 70\_, la vegetación presenta diferentes composiciones en relación altitudinal o micr (qz zigozorq) odorraglA

Palo lanza (Terminalia sp)

Perilla (Phyllostylon rhamnoides)

Toborochi (Chorisia sp)

Estrato medio.

Guayabilla (Psidium sp)

Saguinto (Aulomyrsia sp)

Taquillo (Prosopis sp)

Tusca (Acacia sp)

Garrancho (Acacia sp) Guaranguay (Tecona sp) Carnaval (Cassia sp) Churqui (Acacia sp)

Estrato Arbustivo y Herbáceo.

Estrato Arbustivo y herbáceo.

Capparis sp Croton sp.

Tala (Celtis sp)

Piñón (Jatropa sp)

Passifloras

Desmodio

Malváceas

Mimosa

Semiárido, cubre una superficie de 966.76 Kma, que significa el 27.81 % del subandino; la prec (atua abiZ) ataA a 800 mm. anuales con temperaturas medias de 23\_C, las alturas se registran entre los 970 a 1.270 m. sassitran

pendientes hasta de 43\_ La vegetación presenta en sus diferentes estratos las sig (asoradas aixistas) asoradas

Cardón (Harrisia tortuosa)

Ulala (Cereus validus)

Gramíneas.

Cynodon

Dactylon

Digitaria sp

Setaria geniculata

Subhúmedo a seco, esta unidad representa el 21.50 % del piso subandino con una superficie de 747 Km<sub>2</sub>; la precipitación pluvial anual es de 700 a 800 mm. notablemente menor a las anteriores unidades, la temperatura presenta una media anual de 23 \_C y en el extremo noroccidental registra la más baja del conjunto 19 \_C; la altitud va desde los 1.180 a los 1.500 m.s.n.m., con un rango de pendientes entre los 24\_ y 85\_ en laderos elevados. La vegetación presenta la siguiente conformación.

Estrato Arbóreo.

Orco quebracho (Schinopsis haenkeana)

Willca (Anadenanthera macrocarpa)

Algarrobo (Prosopis sp)

Palo zapallo (Pisonia zapallo)

Algarrobilla (Caesapinia sp)

Mistol (ziziphus mistol)

Toborochi (Chorisia sp)

Cala pierna (Chchlospermun sp)

#### Estrato medio.

Taquillo (Prosopis sp)

Tala (Celtis spinosa)

Tusca (Acacia aromo)

Palobrea (Cercidium sp) Garrancho (Acacia sp)

Carnaval (Cassia sp)

## Estrato Arbustivo y Herbáceo.

Arrayán

Choremimi (Castela coccinea)

Sacha limón (Capparis tweediana)

Hediondilla (Cestrum parquii)

Espinillo (Acacia albicoticata)

Cactos

Ulala (Cereus validus)

Sacharosa (Peireskia sacharosa)

Piñon (Jatropha sp)

#### Gramíneas.

Digitaria sp, Setaria, otras.

Semiárido, cubre una superficie de 966.76 Km2. que significa el 27.81 % del subandino; la precipitación es de 600 a 800 mm. anuales con temperaturas medias de 23\_C, las alturas se registran entre los 970 a 1.270 m.s.n.m., con pendientes hasta de 43\_. La vegetación presenta en sus diferentes estratos las siguientes especies: 199 geografias?

## Estrato Arbóreo.

Orco quebracho (Schinopsis haenkeana)

Urundel (Astronium urundeuva)

Cebil (Anadenanthera sp)

Algarrobo (Prosopis sp)

Calapierna (Cochlospermum argentinense)

Palo zapallo (Pisonia zapallo)

Palo blanco (Calycophyllum multiflorum)

Subhúmedo a seco, esta unidad representa el 21.50 % del piso subandino con una su (qa sisirod)) incorodoT

precipitación pluyial anual es de 700 a 800 mm. notablemente menor a las ante (encipitación pluyial anual es de 700 a 800 mm.

presenta una media anual de 23 \_C y en el extremo noroccidental registra la más baja del co (qa allarba)) ollirba) Quebracho Blanco (Aspidosperma quebracho blanco) de guarante mana, con un sana, con

#### Estrato medio.

Algarrobilla (Caesalpinia sp)

Tala (Celtis spinosa)

Garrancho (Acacia sp)

Brea (Cercidium australe)

# Palo mataco (Achatocarpus macrocarpa)

Choroque (Ruprechtia triftora)

#### Estrato Arbustivo.

Sacha sandía (Capparis Salicifolia)

Sacha limón (Capparis tweediana)

Ancoche (Vallesia glabra)

Tinajero (Croton sp)

Afata (Sida acuta)

Ortiga (Urera caracasana)

Afata (Sida acuta)

Pasto grama (Cynodon sp)

Cactos y gramíneas

#### Pie de monte o transición.

Este paisaje ocupa la parte central del área de estudio y es el menos representativo de los tres en cuanto a superficie; tiene 2.119 Km<sub>2</sub> y significa el 21.62 % del total del área. En este paisaje que se destaca por su tradicional actividad maderera (elaboración de durmientes), se han identificado 2 unidades climáticas vegetales.) obsidos odos identificado 2 unidades climáticas vegetales.

Subhúmedo a seco, es la mayor entre estas dos unidades, ocupa una superficie de 1.641.29 Km<sub>2</sub>, representando el 77.44 % de esta faja intermedia, la precipitación está entre los 600 y 800 mm. año, la temperatura media anual es de 23\_C, la altitud fluctúa entre los 490 y 900 m.s.n.m., con pendientes muy bajas 0.5\_ a 2, sin embargo en algunos sectores se tiene pendientes de 35 y 40. La vegetación tiene características xerofíticas del chaco transicional a la parte húmeda del Aguaragüe donde se destacan las siguientes especies que amorgan de la parte húmeda del Aguaragüe donde se destacan las siguientes especies que amorgan de la parte húmeda del Aguaragüe donde se destacan las siguientes especies que amorgan de la parte húmeda del Aguaragüe donde se destacan las siguientes especies que amorgan de la parte húmeda del Aguaragüe donde se destacan las siguientes especies que amorgan de la parte húmeda del Aguaragüe donde se destacan las siguientes especies.

#### Estrato Arbóreo.

Cebil (Anadenanthera macrocarpa) Quebracho colorado (Schinopsis sp) Quebracho Blanco (Aspidosperma quebracho blanco) Algarrobo (Prosopis alba) Palo blanco (Calycophyllum multiflorum) Urundel (Astronium urundeuva)

Lapacho (Tabebuia sp) Mistol (ziziphus mistol) Toborochi (Chorisia sp)

#### Estrato Medio.

Choroque (Ruprechtia triflora) Tusca (Acacia sp) Tala (Celtis spinosa) Palo mataco (Achatocarpus macrocarpa)

#### Arbustos.

Sacha sandía (Capparis salicifolia) Este paisaje se extiende hacia el extremo oriental hasta el límite internacional (anaibaevi siraqqa) nòmil acha Paisaje más extenso con 4.204 Kms, que significa el 42.90 % del área total de estu (sauta sinagas) otoro Poroco hosque ralo pero en algunos lugares denso; tienen como característica principal la micro (ardalg aisella) ahocana Matagusano (Solanum argentinum) Thomosa su pupo, extremadamente xeromorti (munitire de porte modelano a bujo, extremadamente xeromorti (munitire de porte m

El subhúmedo seco a semiárido, esta unidad comprende una franja delgada vertical a la altura de Pinot Superficie de 56 Km2 o sea el 132 % de este paisaje, que en realidad es un án (asonahas aixlearaf) asonahas Ulala (Cereus sp) Carahuata (Bromelia spp)

Subhúmedo seco. En la llanura aluvial chaqueña esta unidad ocupa el 48.42 % con una superficie de 2.456 Km: Semiárido, unidad que abarca una superficie de 478 Km<sub>2</sub>, representando el 22.55 % de la zona de transición o pie de monte; la precipitación es de 800 mm. bajando a 600 mm. hacia la región este; la temperatura mantiene un rango de 23\_C. a 24\_C media anual, la altitud va desde los 700 a los 875 m.s.m.m., con pendientes 0.5\_a 11\_La vegetación presenta una constitución de bosque ralo, xeromórfico semideciduo porque tiene especies sempervirentes como Schinopsis sp. (Quebracho colorado), que permanece con hojas incluso en la época seca; otras especies como: Anadenanthera macrocarpa (Cebil), Pisonia sp. (Palo zapallo), Chorisia sp. (Toborochi) y otros, pierden sus hojas en la época seca 17

<sup>17</sup> Vegetación y uso actual de la tierra. cap 8, pag 21

# Las especies más destacadas son:

Cebil (Anadenanthera macrocarpa)

Estrato Medio.

tiene 2.119 Km2 y significa el 21.62 % del total del área. En este paisaje que se destaca por su tra.osròdrA otarta maderera (elaboración de durmientes), se han identificado 2 unidades climát (qa aiaqonida) obarolos odardauQ

Urundel (Astronium urundeuva)

Subhúmedo a seco, es la mayor entre estas dos unidades, ocupa una superficie (agracorsam aradtnanabanA) lideO

77.44 % de esta faja intermedia, la precipitación está entre los 600 y 800 mm. año, la tem(qz aisirod) idorodoT de 23\_C, la altitud fluctúa entre los 490 y 900 m.s.n.m., con pendientes muy haj (ollaquez sinosia) ollaquez olaq

algunos sectores se tiene pendientes de 35\_ y 40\_. La vegetación tiene características xe (qs ainiqlasea)) ollidorraglA

a la parte húmeda del Aguaragüe donde se destacan las sigu(oansld odordeup amagadada) oansld odordeup Quebracho blanco

#### Estrato Medio.

Choroque (Ruprechtia sp)

Brea (Cercidium sp)

Tala (Celtis spinosa)

Espinilla (Acacia sp)

# Estrato Herbáceo y arbustivo.

Hediondilla (Cestrum parqui)

Chorimimi (Castela coccinea)

Tinajero (Croton sp)

Sachasandía (Capparis salicifolia)

#### Cactos.

Ulala (Cereus sp)

Sacharosa (Pereskia sacharosa)

Cardón (Harrysia sp)

Carahuatas (Bromelia spp)

# Llanura aluvial chaqueña.

Este paisaje se extiende hacia el extremo oriental hasta el límite internacional con la República del Paraguay; es el paisaje más extenso con 4.204 Km2, que significa el 42.90 % del área total de estudio., se caracteriza por tener un bosque ralo pero en algunos lugares denso; tienen como característica principal la microfilia, apéndices espinosos, corteza rugosa; árboles de porte mediano a bajo, extremadamente xeromórficos 18 se identificaron tres unidades climáticas vegetales:

El subhúmedo seco a semiárido, esta unidad comprende una franja delgada vertical a la altura de Pinote con una superficie de 56 Km2 o sea el 1.32 % de este paisaje, que en realidad es un área de transición entre el Chaco subhúmedo seco a la llanura semiárida.

Subhúmedo seco. En la llanura aluvial chaqueña esta unidad ocupa el 48.42 % con una superficie de 2.456 Km<sub>2</sub>. La precipitación anual es extremadamente baja, sólo alcanza entre los 550 a 650 mm., la temperatura media anual es de 24\_C, su altitud oscila entre los 380 a los 590 m.s.n.m., con pendientes planas o casi planas de 0.5\_ a 3.5\_. La vegetación presenta las siguientes especies representativas. I obsede la diffusión presenta las siguientes especies representativas.

#### Estrato Arbóreo.

como Schinopsis sp. (Quebracho colorado), que permanece con hojas incluso en la époc como: Anadenanthera macrocarpa (Cebil), Pisonia sp. (Palo zapallo), Choris (qs zisqonidos) obsrolos odosrdou

Ouebracho blanco (Aspidosperma sp)

Algarrobo (Prosopis sp)

Mistol (Ziziphuus mistol)

18 Ob. cit.

Algarrobilla (Caesalpinia sp)
Chañar (Geofroea decorticans)
Toborochi (Chorisia sp)

Estrato medio.
Tala (Celtis spinosa)
Palo mataco (Achatocarpus macrocarpa)
Choroque (Ruprechtia sp)

Estrato Arbustivo y Herbáceo.
Chorimimi (Castela coccinea)
Capparis spp

## Cactáceas Bromeliáceas

Semiárido a árido; ocupa 1.692 Km<sub>2</sub>, el 40.24 % de este paisaje. Esta unidad presenta características de estabilidad muy críticas, su geomorfología es de origen eólico, conformado por dunas de arena, donde la cobertura vegetal juega como único elemento de conservación de suelos. Tiene una precipitación de 300 a 500 mm. anuales, la temperatura media anual es de 24\_C, la altitud es de 360 a 450 m.s.n.m. y pendientes planas o casi planas 0.5\_ a 4\_, vegetación achaparrada, espinosa, caducifolia. Especies notables:

#### Estrato Arbóreo.

Quebracho colorado (Schinopsis sp) Quebracho blanco (Aspidosperma sp) Mistol (Ziziphus mistol) Algarrobilla (Caesalpinia sp) Toborochi (Chorisia insignis)

#### Estrato Medio.


Choroque (Ruprechtia sp)
Palo Mataco (Achatocarpus macrocarpa)

## Estrato Herbáceo y Arbustivo.

Capparis spp Garrancho (Acacia sp)

# Diversas gramíneas

Cactáceas



Uso actual del suelo. En base a la información recopilada por el DISE-Chaco, estudios del PDAM-CORDECH y de observación y entrevistas personales, se ha concluido con datos de las siguientes actividades en el área de estudio.

En la actividad pecuaria se consideró la población ganadera en relación con el territorio cantonal; tomando como índice para ramoneo y pastoreo 20 Has. por unidad de ganado bovino, estableciéndose la intensidad de carga expresada en el siguiente cuadro.

			119.940	
> 20	Has leabera-l	Pastoreo débil	27.490	OVI
				Machareti
de 20 a 15	Has./cabeza-l	Pastoreo moderado		
1. 15 . 10	Has lookage 1	Donato Base francis		
de 15 a 10	Has./cabeza-i	Pastoreo fuerte		
menos de 10	Has./cabeza-5	Sobrepastoreo		
	8.1	184		
		CUADR	RO Nº 10	

INTENSIDAD DE CARGA ANIMAL POR CANTONES

CANTON Secretary	SUP./HAS.	one casezas dioni babivi	HAS./ CABEZA	DECEMBER OF THE SECTION OF THE SECTI
Carandayti	627.286	20.427	30.7	Pastoreo Débil
Iguembe	119.031	6.979	17.0	Pastoreo Moderado
Ivo	26.552	3.939	6.7	Sobrepastoreo b
Machareti	52.555	3.648	14.4	Pastoreo Fuerte
Ñancaroinza	52.922	3.511	15.0	Pastoreo Débil
Huacaya	58.758	2.480	23.6	Pastoreo Fuerte
Tiguipa	26.364	2.301	11.4	Pastoreo Fuerte
Santa Rosa	17.849	1.627	10.9	Pastoreo fuerte
Boicobo	12.016	1.107	10.8	Pastoreo fuerte
Bororigua	20.436	949	21.5	Pastoreo Débil
Camatindi	9.807	546	17.9	Pastoreo Moderado
TOTALES	1.023.576	47.514	de leña	estimados en el consum

Fuente: Encuesta DISE-Chaco. 1.993.

De esta manera se establece que el área más afectada es la del cantón Ivo con 6.7 Has/cabeza señalando sobrepastoreo y área de riesgo ambiental; los cantones de Santa Rosa, Boicobo, Ñancaroinza, Macharetí y Tiguipa con pastoreo fuerte; luego Iguembe y Camatindi con pastoreo moderado y finalmente el cantón Carandaytí con pastoreo débil (ver cuadro N° 10), sin embargo en esta última situación cabe señalar que se registra un sobrepastoreo en el área circundante a esta población (Carandaytí) ver mapa N° 7.

De aquí se desprende que del total del área de estudio tenemos que la superficie sobrepastoreada es de 27.490 Has., más 10.000 Has. estimadas en los alrededores de Carandaytí suman 37.490 que representan el 3.6 %; en lo que se refiere a la superficie de pastoreo fuerte abarca un total de 162.780 Has. o sea el 15.8 % del área de estudio; la superficie de pastoreo moderado es de 129.940 Has. y significa el 12.6 %, finalmente el pastoreo débil expresa las siguientes cifras 707.370 Has. que es el 68.8 %.

La actividad agrícola se manifiesta en el siguiente cuadro expresado en porcentaje de superficie cultivada sobre el total del territorio cantonal.

La agricultu

<sup>\*</sup> Diferencia de superficie total del cantón con la superficie cultivada.

# Uso actual del suelo. En hase a la información r11°N ORGAUD ISE-Chaco, estudios del PDAM-CORDECH y de observación y entrevistas personales, se ha ODAHO - GRIQuos de las siguientes actividades en el área de

#### SUPERFICIE CULTIVADA POR CANTONES

índice para ramoneo y par expresada en el siguiente c

on el territorio NOTINAS estantendos	era en relación c . ZAH\. quz ganado bovino,	SUP. CULTIVADA (HAS.)	PORCENTAJE
Carandaytí	627.780	499	0.07
Iguembe	119.940	897	0.74
Ivo	27.490	938	3.41
Macharetí	52.790	235	0.44
Ñancaroinza	53.000	obstabom 78	1209-0-14
Huacaya	59.000	236	0.4
Tiguipa	26.590	225	0.84
Santa Rosa	18.200	350	1.92
Boicobo	12.200	184	1.5

20.590

10.000

1.027.580

135

0.65

.92

Fuente: Encuesta DISE-Chaco. 1.993.

TOTALES

Bororigua

Camatindi

La agricultura en el área de estudio ocupa sin duda un lugar secundario después de la ganadería; como se observa en el cuadro las superficies cultivadas señalan una actividad incipiente del sector, mostrando en general características de una economía de subsistencia o en algunos casos, como Ivo, que se destina parte de la producción a la alimentación de ganado (porcino) y en Macharetí, Tiguipa se ha empezado a incursionar en el cultivo de soya con destino a la fábrica de aceite de Villamontes.

La actividad en el sector forestal manifiesta claramente dos aspectos, uno en la zona subandina referido a la extracción de leña para combustible como una necesidad de consumo familiar y el otro en que se suma a esa actividad la tala de árboles con carácter industrial y el corte de postes para alambrados perimetrales de estancias ganaderas y de protección a la carretera Camiri-Yacuiba en el sector de Luis Calvo; actividades que se desarrollan en las zonas de piedemonte y llanura chaqueña (ver mapa N° 7).

Los volúmenes estimados en el consumo de leña los extraemos de un taller del DISE-Chaco, realizado en la localidad de Ivo en el mes de Octubre 1.993 en el cual señalan los comunarios que por familia y por día consumen un jase de leña<sup>19</sup>, con esta información elaboramos el cuadro siguiente.

# CUADRO Nº 12 De esta manera se establece que el área más afect OZACO - SEIO Ivo con 6.7 Has/cabeza señalando sobrepastoreo y área de riesgo ambiental; los categoración a Seno Anoma Anoma Seno Anoma Anoma

CANTON	POBLACION/FLIAS.	CONSUMO ANUAL (M3)
Carandaytí	570	20.520
Iguembe	230	8.280
Ivo superficies ovi	cogdio tenemos que la	524. yel area d
Machareti	sect Carandayti suman	nobeber 6 .948
Comment of the commen	64	2 304
Huacaya	uet un total de 162.780	2.844
Tiguipa	464 las, y significa el 13	000 1.620
Santa Rosa	188	6.768
Boicobo	64	2.304
Bororigua	48	1.728
Camatindi	obezaneza orbeta al83i	2.988
TOTAL	1.771	63.756

Fuente: Encuesta DISE-Chaco. 1.993.

Dentro de las perspectivas de crecimiento de la población, de planificación y desarrollo regional, este aspecto se torna en un problema visible que merece preocupación de las organizaciones e instituciones con presencia en este territorio. La demanda en el uso del recurso forestal en esta actividad va en aumento, lo cual hace prever condiciones de riesgo ambiental en un futuro próximo, para ello deben tomarse medidas que ayuden a mitigar esta situación, buscando alternativas de sustitución y/o realizar plantaciones forestales para cubrir estas necesidades.

#### 4.7.1. Fauna.

"Todavía podemos decir que Bolivia es un país rico en recursos naturales renovables: contamos con algo más de 1.512 especies y subespecies de aves, de las 9.020 especies que existen en el mundo, número que a su vez representa el 50 % de las aves sudamericanas, y con alrededor de 500 mamíferos de las 4.000 especies catalogadas en el mundo, con un hecho muy importante, alrededor de una docena de especies son exclusivas de Bolivia, hecho que merece un mayor cuidado en proteger esa fauna." 20 estamble supresenta de sepecies son exclusivas de Bolivia, hecho que

En el área de estudio para la zona de la llanura el CIMBOC (Centro de Investigación y Mejoramiento Bovino Criollo) en convenio con la Fundación Miguel Lillo de Tucumán, Argentina; han realizado un relevamiento de Fauna Silvestre en el cual registraron 147 especies de aves, de las cuales colectaron 101 ejemplares para su identificación definitiva en la Fundación M. Lillo. En lo que se refiere a mamíferos los datos de presencia de estos en la región, señalan que serán listados en un informe final 21

Otros estudios puntuales de la fauna del área de estudio, no se encuentran. Con referencia general vamos a citar los siguientes cuadros elaborados por el Centro de Datos para la Conservación, 1.988. 22

# LISTA DE ANIMALES QUE REQUIEREN PROTECCION PRIORITARIA

GRUPO Y ESPECIE	NOMBRE COMUN	ZONA DE DISTRIBUCION
CAMELIDAE		
Lama guanicoe	Guanaco	Chaco
CERVIDAE		
Oidocoileus dichotomus	Ciervo de los pantanos	Beni y Chaco
Felis Onca	Jaguar	Beni y Chaco
AVES		
Sarcorampus papa	Cóndor de los trópicos	Amázonico-Chaqueño
REPTILES	•	
Caimán latirostis	Overo	Amázonico-Chaqueño
		•

# LISTA DE ANIMALES QUE REQUIEREN UN PLAN DE MANEJO 23

GRUPO Y ESPECIE	NOMBRE COMUN	ZONA DE DISTRIBUCION
Dasiypodidae		
Priodontes Maximus	Pejichi	Beni y Chaco
Dicotilidae		
Tayassu albirostris	Chancho de Tropa	Amázonico-Chaqueño
Tayassu tajacu	Taitetú	Amázonico-Chaqueño
AVES		20 Kempff Mercado N. 1986, impacto del desa
Cairina moschata	na silvestre, informeorgan oraquanpaña otoño 19	Amázonico-Chaqueño MO
Pénelope jaequacu sbroilqa algole	VACION, 1988, cabatniq ava ambiente y eco	Amázonico-Chaqueño
Aratinga acuticaudata	Cotorra Cabeza azul	Amázonico-Chaqueño

Myopsitta monachus di olio di Cata di noi saldo al solo di simico di Amázonico-Chaqueño di Servicio di Cata di noi saldo al solo di Servicio di Cata d

4.7.1. Fauna.

Otras especies características y relativamente abundantes son los cérvidos :

"Todavía podemos decir que Bolivia es un país rico en recursos naturales renovables: contamos con algo más de 1.512 especies y subespecies de aves, de las 9.020 especies quanirU n en el mundo, número quanciamas amazaM el 50 % de las aves sudamericanas, y con alrededor de 50 usano feros de las 4.000 especiariduosaog amazaM mundo, con un hecho muy importante, alrededor de una docena de especies son exclusivas de Bolivia, hecho que

Dentro de las especies endémicas del Chaco y que además se ha confirmado como especie de población reducida es el Pecarí del Chaco (Catagonus wagneri) y como especie en peligro de extinción que habita el subandino tenemos el oso de anteojos o jucumari (Tremarctos ornatus). Señala Noel Kempff M. en el trabajo ya citado que entre las aves se tiene varias especies que se han constituido como plagas de la agricultura con poblaciones en constante aumento como consecuencia del incremento de los mismos cultivos como la totaqui (Zenaida auriculata), la torcaza cenicienta (Columba maculosa) y algunas especies del género Psitacidae.

Finalmente señalaremos algunas especies de importancia incluidas en convenciones internacionales como CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de Fauna y Flora) y la legislación boliviana, especies que tienen una regulación en su comercialización, manejo o protección; así tenemos: el Anta (Tapirus terrestris), sujeta a manejo, el Piyo (Rhea americana), Charata (Ortalis canicollis), loro hablador (Amazona a estiva), tucán (Ramphastos toco), cardenal (Paroaria coronata) para su protección y manejo adecuado; en reptiles para manejo se tiene el peni (Tupinambis tequixin y la peta (Geochelone carbonaria).

CAMELIDAE

Lama guanicoe

CERVIDAE

Oidocoileus dichotomus

Felis Onca

Sarcorampus papa

Céndor de los trópicos

Amázonico-C

Amázonico-C

Amázonico-C

Caimán latirostis

Condor de los trópicos

Amázonico-C

Amázonico-C

LISTA DE ANIMALES QUE REQUIEREN UN PLAN DE MANEJO 23

SRUPO Y ESPECIE NOMBRE COMUN ZONA DE DISTRIBUCION

Pejichi Beni y Chaco
Dicotilidae
Charcho de Tropa Amázonico-Chaqueño
Tayassu tajacu Taitetú Amázonico-Chaqueño

Aratinga acuticauda


<sup>\*</sup> Es extensivo al subandino en la región del Chaco.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kempff Mercado N. 1986, impacto del desarrollo en la ecológia del trópico boliviano. Santa Cruz

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> CIMBOC. El Salvador, relevamiento de fauna silvestre, informe preliminar campaña otoño 1993

<sup>22</sup> CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION, 1988, en Bolivia medio ambiente y ecología aplicada

<sup>23</sup> CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION, 1988



## 4.8. Areas de uso actual del suelo y potencial similares y compatibles con el medio ambiente.

Se pudo establecer confrontando el mapa de suelos con el de uso actual del suelo las situaciones siguientes :

# 4.8.1. Areas de uso actual y potencial similares y compatibles con el medio ambiente.

El área de estudio presenta características complejas por sus condiciones de relieve, clima, suelos y vegetación que la restringen severamente en sus posibilidades de desarrollo agrícola en la situación actual, cruzando la información obtenida de los estudios realizados por el Departamento de Recursos Naturales de CORDECH en suelos, vegetación y riesgos de erosión se ha identificado una única situación que establece esta relación de compatibilidad entre el medio ambiente y el uso actual. Esta situación está referida a áreas que poco o nada han sido intervenidas por el hombre; debido a su difícil acceso, a su pronunciada pendiente y suelos poco profundos como son las serranías del Aguaragüe, Caipipendi, Huacaya, Tentayapi, Sararenda que están clasificados como suelos de clase VIIIesc; otra área con la misma situación de intervención es la ubicada en la llanura chaqueña y se trata del paisaje de Dunas, frontera con el Paraguay, suelos clasificados también como clase VIIIesc, en los cuales la actividad ganadera casi no tiene presencia (ver mapa Nº 8)

## 4.8.2. Areas de uso actual y potencial disímiles.

Como señalamos en el anterior punto las limitaciones que presenta el área para las diversas actividades agropecuarias o forestales tienen elementos característicos en cada una de las tres unidades fisiográficas o pisos ecológicos como el subandino, piedemonte y la llanura chaqueña, además de ello existen diferentes grados o intensidades de disimilitud entre el medio ambiente y el actual uso. A continuación veremos y analizaremos dos situaciones; la primera referida a :

**Optimización ambiental.** En la Faja del subandino se presentan áreas en las terrazas aluviales y pendientes inferiores de serranía, con actividades agrícolas que por sus prácticas culturales corren riesgos de erosión hídrica y que en algunos casos ya se visualizan procesos erosivos con pérdida de suelos y formación de cárcavas.

Un manejo adecuado de suelos con cultivos en curvas de nivel y el aprovechamiento de aguas para riego optimizarían el potencial de estos minimizando sus riesgos, considerando precisamente que el potencial agrícola se presenta en estos valles intercolinares con suelos más profundos, de buen drenaje interno y en general de textura frondosa, clasificados como suelos de clase II y III, con limitaciones sc o esc (ver mapa N° 3) que pueden corregirse. Los pisos medios están dedicados a la actividad ganadera con diferentes intensidades de pastoreo que deberán regularse de acuerdo a la oferta forrajera de la biomasa de su vegetación o en casos como el que se presenta en el cantón de Ivo deberá limitarse el número de ganado debido al sobrepastoreo que hoy existe; en situación similar se encuentran los cantones de Santa Rosa y Boicobo.

En el piedemonte se encuentra una mayor potencialidad de suelos con vocación agrícola que en el sector subandino. Estos suelos esc o sc (ver mapa Nº 6) y que consideramos posible la corrección en aquellos de clase IIsc adoptando medidas de conservación y manejo adecuados como ser la incorporación de riego y fertilizantes, otra práctica de importancia es la de protección de suelos contra la erosión dejando cortinas rompevientos. Estas áreas de optimización ambiental con el uso actual, en general están localizadas en tierras con posibilidades de riego como las que permiten los ríos de Macharetí, Tiguipa y Camatindi (Ver mapa Nº 4).

En la llanura la mayoría son suelos de clase IV (ver mapa Nº 6) con limitaciones climáticas, suelos con baja capacidad de retención de humedad y baja fertilidad de difícil corrección. Se estima una racionalización (optimización) para su uso pecuario mejorando la alimentación de este que es el de ramoneo extensivo con la implantación de pasturas mixtas (gramíneas-leguminosas) adaptadas a las condiciones de la región, sin eliminar la

vegetación natural en sus estratos superiores o con la práctica de monte mejorado, experiencia que viene desarrollando el CIMBOC (Centro de Investigación de Mejoramiento del Bovino Criollo), notaco el moderno el composiço de mejoramiento del Bovino Criollo.

Uso actual incompatible y de reorientación. Esta es una segunda situación que se manifiesta en áreas en las cuales el uso actual pone en riesgo la estabilidad de los suelos como ocurre en los sectores de divisoría de aguas, cuencas hídricas o derrumbes o deslizamientos especialmente ubicados en la faja subandina; para ello debe tomarse decisiones de protección, evitando actividades de pastoreo, quema de la vegetación u otra que signifique riesgo.

En el piedemonte y llanura los suelos de clase V, VI y VII con limitaciones sc,wsc y esc (ver mapa Nº 6) que actualmente están dedicados a ramoneo extensivo o a la tala selectiva en especial del Quebracho Colorado deben reorientarse a forestación (los de subclase wsc) y los suelos de clase VIIesc a protección, en consideración a los severos factores limitantes de clima, baja capacidad de retención de humedad de los suelos y baja fertilidad de los mismos (ver mapa Nº 8).

# 4.8.3 Areas de riesgo y amenaza que restringen o imposibiliten la localización de : población, infraestructura física u otros, ind somo imposibilidad por la companion de comp

Para identificar estas áreas se han considerado aspectos geomorfológicos en su configuración y clima como : precipitación, temperatura y vegetación, que definen condiciones de potencial o riesgo para localizar asentamientos humanos, construcciones viales, industriales u otras; en este sentido se han identificado las siguientes áreas que imposibilitan estas acciones.

En el paisaje subandino, que se caracteriza en general por un relieve de serranías paralelas, orientadas en sentido norte sud; presenta restricciones casi en el total de su superficie. Podemos señalar que todo el complejo de serranías altas están conformadas por anticlinales estrechos que definitivamente imposibilitan la localización de asentamientos humanos; por otra parte deberá considerarse para la elaboración de proyectos de infraestructura, las áreas definidas en el estudio de geomorfología (Departamento Recursos Naturales-CORDECH-Mapa de Riesgos de Erosión) en el cual se señalan regiones de remosión o movimientos de masas como derrumbes y deslizamientos que limitan la construcción de estos.

El sistema geomorfológico del área de transición que se halla desarrollado entre la faja subandina y la llanura chaqueña y que por sus características de relieve se halla constituido por paisajes de serranías bajas, colinas altas, medias y bajas, llanura aluvial: erosionada, ondulada, inundable, no inundable, deposicional; terrazas aluviales y playas; presenta en su conformación situaciones de mayor estabilidad en general. Sin embargo se encuentran áreas de riesgo que no hacen posible el desarrollo de construcciones de infraestructura física o de asentamientos humanos como son las áreas formadas por las terrazas aluviales recientes o medias que están sometidas a procesos de degradación, de inundación y corrientes de barro, que se encuentran en los abanicos de los ríos Macharetí, Tiguipa y Camatindia, apparados sometidas a procesos de degradación, de inundación y corrientes de barro, que se encuentran en los abanicos de los ríos Macharetí, Tiguipa y Camatindia, apparados sometidas a procesos de degradación, de inundación y corrientes de barro, que se encuentran en los abanicos de los ríos Macharetí, Tiguipa y Camatindia, apparados sometidas a procesos de degradación, de inundación y corrientes de barro, que se encuentran en los abanicos de los ríos Macharetí, Tiguipa y Camatindia.

En la llanura chaqueña que está tipificada por presentar una topografía casi plana en la mayor parte de su superficie, con pequeñas ondulaciones hacia el este, muestra limitaciones mayores de clima conforme se va integrando hacia la frontera con el Paraguay, baja precipitación, baja capacidad de retención de humedad edáfica, elevadas temperaturas y vegetación arbustiva que condicionan severamente el asentamiento de poblaciones humanas. El desarrollo de obras de infraestructura deberán sujetarse a estudios de mayor detalle para evitar especialmente la degradación de la cobertura vegetal, que cumple una función vital de estabilización de los suelos de esta región.

# 5. Síntesis de las principales problemáticas y potencialidades ambientales.

Los problemas principales que se observan en el área de estudio, están originados por dos causas, una antrópica y la otra de origen natural. En el sector subandino uno de los problemas mayores, está relacionado con la actividad

humana y directamente a la actividad pecuaria. Se ha determinado en las áreas ubicadas en la parte central norte y noreste comprendidas en los cantones de Santa Rosa e Ivo, un proceso de degradación de suelos originado por pérdida de la vegetación, debido al sobrepastoreo que existe en estos lugares. También se manifiesta una situación similar en la zona central que comprende el cantón de Bororigua. En este sector, el subandino, se observan también prácticas de desbosque con fines agrícolas (agricultura migratoria) y tala de la vegetación como combustible de uso doméstico que empiezan a constituirse en problemas de riesgo ambiental. Los problemas de carácter natural están referidos a clima, suelos y relieve; así tenemos zonas semiáridas en el sector sud, en las cuencas que comprenden los ríos Huacaya e Iguembe, en el norte se presenta en el área de Cuevo, Santa Rosa, Ivo y proximidades; clima caracterizado por una notable sequedad, bajo porcentaje de humedad y ninguna excedencia de agua. Los suelos en los pisos medios, altos y cimas presentan limitaciones por su poca profundidad, inestabilidad y baja fertilidad; en su relieve presenta problemas de pendientes fuertes que están relacionados directamente con el uso del suelo, escorrentías superficiales, remosión de masas, deslizamientos, etc.

Como potencialidades ambientales encontramos áreas con posibilidades de desarrollo agrícola, especialmente en los piedemonte localizados en los valles formados por escorrentías de aguas superficiales como la de los ríos Iguembe, Huacaya y Cuevo. En terrenos abruptos de mayor pendiente, como las pendientes bajas y medias se pueden implantar cultivos perennes con especies de frutales o forestales. Para la crianza de ganado bovino existe un potencial que deberá ser sometido a una práctica de manejo más cuidadoso con el debido apoyo de asistencia técnica. Otro potencial que está sujeto a evaluación y estudio en su calidad, volumen y costos de producción es el de los yacimientos de yeso (sulfato de calcio hidratado) y que se localizan en las áreas de Boicobo y Huacaya. Finalmente tenemos una gran superficie que se puede destinar como áreas de recreación y/o centros de investigación y manejo de la flora y fauna de la región.

En la unidad fisiográfica de piedemonte o transición se detectan como problemas antrópicos los ocasionados por sobrecarga ganadera en las áreas que comprenden los cantones de Ñancaroinza, Tiguipa, Camatindi, Macharetí y alrededores de la localidad de Carandaytí; ésta última afectada por la suma de actividad agrícola. La extracción de recursos forestales durante muchos años ha originado también problemas de degradación, en especial la de la especie de Quebracho Colorado. Es necesario destacar que las zonas más afectadas en su cobertura vegetal son aquellas en las que se encuentran las haciendas más grandes; situación que confirma la necesidad de un manejo adecuado ganadero en la región. Problemas de origen natural están referidos especialmente a la marginalidad de suelos y clima que presentan limitaciones donde el déficit de agua es el factor dominante en el uso de estos; caracterizados además por un drenaje pobre o nivel alto de la napa freática. En las zonas sur de Tiguipa y norte del Salvador se encuentran formaciones colinosas, las cuales presentan suelos susceptibles de erosión y cobertura de bosque bajo degradado.

El potencial de esta unidad está definida para agricultura en áreas con posibilidades de riego inherentes a las cuencas que forman los ríos de Macharetí (5.000 Has.), Tiguipa (800 Has.) y Camatindi (80 Has.)<sup>24</sup>. Los suelos de subclase IVc (ver mapa Nº 6) presentan aptitudes para la crianza bovina con correcciones adecuadas en el problema de deficiencia de agua. Por otra parte los suelos marginales a estas actividades, se los puede destinar a plantaciones y manejo forestal.

La unidad fisiográfica de la llanura presenta problemas de intervención humana alrededor de haciendas ganaderas y en el extremo noreste, chaqueos con quema de la cobertura vegetal en el sector más frágil de la llanura aluvial donde se tiene procesos de dunas activadas. El mayor problema por causas naturales, se manifiesta en el clima que se presenta como semiárido (D) y semiárido a árido (D-E) mapa Nº 5; con una manifiesta deficiencia en el régimen hídrico, cuenta con una precipitación de 600 a 400 mm. anuales.

5. Síntesis de las principales problemáticas y potencialidades ambientales.

Los problemas principales que se observan en el área de estudio, están originados por dos causas, una antrópica y la otra de origen natural. En el sector subandino uno de los problemas mayores, está i**vi omot HOEDROO NN**. **33 42** 

El potencial agrícola se reduce a sectores pequeños comprendidos a áreas con posibilidades de riego que presentan las microcuencas formadas por las quebradas de Iguamiranti, Carandaytí y de Ñaguapua; la actividad ganadera como potencial estaría condicionada de igual manera que la zona de transición, a suelos de subclase IVe. El bosque en las unidades de transición y llanura, ofrecen un interesante potencial de la especie del Quebracho blanco, especie que prácticamente no ha sido tocada y que con un aprovechamiento racional, puede generar una fuente de recursos expectable; también como potencial se presenta los hidrocarburos con posibilidades de una mayor extracción en el área de estudio.

Finalmente como problemas generalizados en el área de estudio, señalaremos dos situaciones; una la de la fauna silvestre que ha sufrido un considerable deterioro, debido a las siguientes causas: la cacería a que ha sido sometida con fines de comercialización ilegal de cueros, otra ocasionada por los campamentos madereros que se dedican a la cacería de animales silvestres para abastecerse de carne y otra causa es la ocasionada por migraciones y el desconocimiento del nuevo hábitat de asentamiento lo cual acrecienta este deterioro de recursos.

La segunda situación está referida a la legislación que a pesar de las diferentes leyes en vigencia en el país, como la Ley Forestal, Ambiental, de Vida Silvestre, Caza y Pesca, etc., en la región no tienen aplicación ni presencia institucional, lo que imposibilita el control y manejo del conjunto de recursos naturales.

# 5.1. Desarticulación interna por características naturales, in ob agam la osed no aseas entre observir dentificado estas areas, en base al mapa de ni servir de la companione de

Se pueden establecer dos sectores bien diferenciados, que si bien mantienen cierta vinculación cada uno internamente, entre ellos existe una completa desarticulación; nos referimos a la zona subandina respecto a las zonas bajas del piedemonte y llanura. Esta desarticulación está originada por el complejo de serranías que cruzan el área de estudio en sentido norte-sur en su extremo occidental formando cadenas paralelas, de altitudes considerables que oscilan entre los 700 a 1.700 m.s.n.m. Este complejo geomorfológico hasta hoy, ha dificultado especialmente la vinculación caminera, situación que imposibilita con evidencia una articulación geopolítica-territorial.

Naturales de CORDECH, las cuales se localizan en los sectores del occidente a lo largo del río Iguembe y en la

## La última legislación vigeme, es la promulgada como Ley Nº 1333 .nòisaldoq y larutan oibam lab nòisalación.

Uno de los indicadores claros que ayudan a visualizar estos aspectos es la actual distribución de la población en relación a las condiciones que oferta del medio donde se desenvuelven; es así que se manifiesta en la zona de valles del subandino asentamientos de población indígena en especial guaraní y con carácter disperso. Las características esenciales de esta conducta obedecen primero a la disponibilidad de tierras agrícolas que por su limitación, tienen que ubicarse a lo largo de las márgenes de los ríos, lugares donde encuentran pequeñas áreas cultivables y la provisión de agua para subsistir; por otra parte manejan una economía complementaria de cacería como fuente de proteína animal. Podemos señalar que en la zona del subandino existe una mayoría de población indígena guaraní, asentada siglos atrás y que se ha desenvuelto con éxito manejando su hábitat; sin embargo la presencia gradual de ganaderos en la zona, ha ocasionado conflictos territoriales y culturales que obligan a su población a migraciones constantes.

Las condiciones que se manifiestan en la zona del piedemonte presentan características diferenciadas a la del subandino en razón a que existen suelos de mayor potencial agrícola, lo que ha permitido un mayor desarrollo de poblaciones concentradas en este sector, otro recurso que ha influido en este sentido es el forestal, nucleando a poblaciones como Tiguipa Estación y Ñancaroinza en torno a estas actividades. La consolidación de esta economía ha permitido poblaciones de mayor estabilidad demográfica en relación al conjunto del área de estudio. Hacia la llanura por las condiciones de menor precipitación y su consiguiente escasez de agua, el territorio se torna más agreste, en el que se desarrolla casi con exclusividad la crianza extensiva de ganado y una población dispersa distribuida en haciendas o puestos ganaderos; la única población que existe en la llanura, es la de Carandaytí, la que presenta una fuerte expulsión de su población. Otro aspecto para señalar, es el que se refiere a la tenencia de la tierra en el sector, donde se muestra la mayor presencia de ganaderos con propiedades de considerable extensión.

Los mayores factores naturales de inhibición para el desarrollo regional son los que hemos venido describiendo relacionándolos con las clases de suelos, en especial en el subandino y el déficit hídrico para la llanura. La potenciación estaría orientada a dar solución al problema de carencia de agua; haciendo captaciones de aguas superficiales y subterráneas, para fortalecer la productividad y economía de la región.

# 5.3 Uso del territorio y sus potencialidades, haccarla los hidrocarlas de presenta los

Actualmente el uso del territorio de ninguna manera esta ordenado, la producción en algunos casos concilia con el potencial que ofrece este, pero en la mayoría de ellos, contrariamente existe disimilitudado o mos estambles.

## con fines de comercialización ilegal de cueros, otra ocasionada por los campamentos asldazilitu on sea A.1.5.5

Con toda la información obtenida y el análisis respectivo de suelos, geomorfología, clima, vegetación, etc. se ha identificado estas áreas que están propuestas como Reserva Forestal y Parque Nacional identificados en el mapa Nº 8. sing la nacionagiz na sevel estampos el parque nacional identificados en el mapa no sevel estampos el parque nacional identificados en el mapa no estampos el parque nacional identificados en el mapa no estampos el parque nacional identificados en el mapa no estampos el parque nacional identificados en el mapa no estampos el parque nacional identificados en el mapa no estampos el parque nacional identificados en el mapa no estampos el parque nacional identificados en el mapa no estampos el parque nacional identificados en el mapa nacional identificados

# 5.3.2 Areas frágiles de aprovechamiento controlado. el control y manejo del controlado.

Se ha identificado estas áreas, en base al mapa de riesgos de erosión, elaborado por el Departamento de Recursos Naturales de CORDECH, las cuales se localizan en los sectores del occidente a lo largo del río Iguembe y en la parte norte que comprenden los cantones de Santa Rosa e Ivo; con suelos sujetos a procesos de erosión hídrica fuerte. En condiciones de menor intensidad de procesos erosivos y que sin embargo merecen control, tenemos áreas en el curso del río Bororigua, alrededores de las poblaciones de Camatindi, Macharetí, Estación de Tiguipa, Ñancaroinza, El Salvador, Carandaytí y algunos sectores al sur de esta última población.

# caminera, situación que imposibilita con evidencia una articulación geopolítica-territ latriaidma nòisalziga.

La última legislación vigente, es la promulgada como Ley Nº 1333 del 27 de abril de 1992 del Medio Ambiente; la que muestra en su concepción una serie de disposiciones que engloban desde sus aspectos de gestión y política ambiental hasta aspectos de regulación, protección, conservación y manejo de los recursos naturales no renovables como los minerales, energéticos y otros en relación a la población y medio ambiente, educación, administración, sanciones, etc. Sin embargo lo que se puede apreciar es que ha sido concebida dentro de un marco muy general en el cual faltan especificidades como por ejemplo, una clara clasificación sobre áreas protegidas, también se observa la necesidad de compatibilizar la presente ley con otras que son inherentes a los diferentes aspectos que la involucran, como la ley forestal, la de minería, de hidrocarburos, etc. Finalmente surge la urgencia de la elaboración de instancias normativas como reglamentos, que viabilicen la aplicación e implementación práctica de esta ley amona aplicación e implementación práctica de esta ley applicación e implementación e implementación práctica de esta ley applicación e implementación e

Los principales objetivos de la ley señalan en sus disposiciones generales lo siguiente : an anox al no combanas

# Capítulo I

Las condiciones que se manificatan en la zona del piedemonte presentan caracteristicas diferenciadas a la Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.

**Artículo 2.-** Para los fines de la presente ley, se entiende por desarrollo sostenible, el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente.

Artículo 3.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio, de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público.

Artículo 4.- La presente Ley es de orden público, interés social económico y cultural.

Se ha transcrito estos 4 artículos con el objeto de conocer fundamentalmente los principales enunciados que trasmite la ley. Además de ello vamos a señalar aspectos referidos a la población y medio ambiente, que consideramos básicos en lo que se supone una futura planificación; es así que en el artículo 75\_ se define una adecuada política de migración en el territorio de acuerdo al <u>ordenamiento territorial</u><sup>25</sup> y a los objetivos de protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Queremos hacer hincapié en esta disposición y la que señala el artículo 78 en los incisos 1 y 2; que indica la necesidad de crear mecanismos y procedimientos para garantizar la participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos de desarrollo ...; y el rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y manejo de recursos naturales con la participación directa de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas; esto en consideración a la presencia notable de comunidades y población indígena en el área de estudio y <u>la importancia</u> de su participación en la planificación y políticas de territorio.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> El subrayado es nuestro.

Artículo 3.- El medio ambiente y los recursos naturales constituy SODINDET SONIMENTE EL OIRASOLD

Aluvio Depósito de materiales sueltos : gravas, arenas, etc., dejados por un curso de agua.

Anticlinal Pliegue convexo de estratos levantados en forma de silla o de hóveda alargada, de manera que forma los pendientes contrapuestos.

Conglomerado Roca sedimentaria clástica, formada por la consolidación de la grava. Son clastos de rocas unidos por cementos calcáreos, silíceos u otros y consolidados diagenéticamente.

Se ha transcrito estos 4 artículos con el objeto de comenza esimenibos a la testas estas productos de la transcrito estos 4 artículos con el objeto de comenza esimenibos a la transcrito estos 4 artículos con el objeto de comenza esimenibos a la transcrito estos 4 artículos con el objeto de comenza estas estas estas en la transcrito estos 5 artículos con el objeto de comenza estas estas en la transcrito estos 5 artículos con el objeto de comenza estas estas estas en la transcrito estos 5 artículos con el objeto de comenza estas estas en la transcrito estos 5 artículos con el objeto de comenza estas estas estas en la transcrito estos 5 artículos con el objeto de comenza estas estas en la transcrito estos 5 artículos estas estas en la transcrito estos estas en la transcrito estas estas en la transcrito estos estas estas en la transcrito estas estas en la transcrito estas estas en la transcrito estas en la tra

la ley. Además de ello vamos a señalar aspectos referro sovisore soseorq roquiramente at el monta de considerada de considerad

Deposición Acción y efecto por el que el hielo, el viento, las aguas corrientes marinas o lacustres, etc., dejan en un lugar, el material que llevan en suspensión.

Discordancia Falta de paralelismo entre estratos situados a un lado y otro de una superficie de erosión.

Duna la granda au la contra de las costas o en zonas secas de tierra adentro.

Erosión Resultante de un conjunto de procesos, siendo los principales la meteorización y el transporte. Que indica para garante de un conjunto de procesos, siendo los principales la meteorización y el transporte.

Estratificación o Disposición general de los sedimentos en capas, características de las rocas sedimentarias y de las tobas volcánicas.

Estrato comb dologico linga Unidad de sedimentación, enerpo tabular de roca sedimentaria, esencialmente homogénea limitada de arriba y abajo.

Facies Conjunto de caracteres petrográficos, que definen un depósito o una roca.

Falla Ruptura de una superficie en dos o más bloques dislocados por movimientos diferenciales de desplazamiento más o menos vertical.

Hiato o Laguna Intercepción de una serie estratigráfica. Tiempo Estratigráfica que media entre la formación de dos estratos.

Horizonte Unidad estratigráfica más pequeña de rocas sedimentarias, paralelas a las capas.

Litología Estudio de las rocas.

Llanura Superficie extensa con pequeñas elevaciones y situada a poca altura sobre el nivel del mar.

Llanura aluvial Formada por aluviones en la desembocadura o en cualquier parte ancha de un valle pluvial.

Metamórficas Rocas que resultan de la transformación que sufren en el interior de la corteza terrestre, sobre todo por cambios de temperatura y presión.

Meteorización Destrucción de rocas y minerales por acción de los agentes físicos (no dinámicos) y químicos de la atmósfera.

Pendiente Superficie inclinada un relieve

Permeabilidad Propiedad de los materiales que se dejan atravesar por fluidos, especialmente aire y agua.

Pliegue . Ondulación de una capa o estrato de amplitud y forma variables.

Relieve Conjunto de formas de una superficie.

Sedimentación Deposición de material rocoso, organismos muertos, substancias químicas o de otros materiales.

Sinclinal Parte cóncava de un pliegue.

Tectónica Parte de la geología, que se ocupa del estudio de la estructura de la corteza terrestre.

Terraza Superficie plana, generalmente estrecha y alargada, que debe su origen a la acción del agua corriente.

Transporte Acarreo de materiales erosionados. Puede ser : ácueo, eólico o glacial.

Valle Terreno más o menos llano a cóncavo entre otros más altos

Yacimiento Lugar donde se encuentra un fósil o un mineral.

Yeso Sulfato de calcio hidratado, fácilmente exfoliable en láminas transparentes.

Zona La Unidad Geológica super regional más pequeña, caracterizada por la propagación vertical de un tipo constante o de una pequeña asociación de flora y fauna autónoma.

Balance Hídrico Determinación de la disponibilidad de la variable agua en una región a través de su excedencia, consumo, déficit o reposición

Cárcava Forma residual resultante de la erosión hídrica. Zanja profunda.

Clima Ambiente atmosférico constituido por una serie de estados de la atmósfera sobre un lugar determinado y según su habitual sucesión.

Coluvio Sedimentos heterométricos que se acumulan por acción de la gravedad, ayudados por la escorrentía superficial.

Cuenca Un sistema natural dinámico circunscrito a un área de drenaje superficial común limitado por la línea de divorcio de las aguas, considerando también su dimensión vertical.

Deslizamiento Movimiento de masas rocosas por gravedad de un plano de deslizamiento.

Derrumbe Movimiento de masas por desplome violento.

Descarga Cantidad de agua que escurre por un punto determinado de un curso de agua, durante un período determinado.

Escurrimiento difuso Escorrentía superficial divagante que forma surcos de hasta 1 cm. de ancho.

Escurrimiento concentrado Escorrentía superficial que forma canales en las pendientes de hasta 3 m. de ancho. Estos escurrimientos en las partes de las pendientes pueden degenerar en cárcavas.

Evapotranspiración real Cantidad de agua que realmente evapora el suelo y transpiran las plantas en un intervalo de tiempo dado y de acuerdo con su circunstancial contenido de humedad.

Humedad relativa Relación entre el peso del vapor de agua que contiene el aire con aquel que contendría si estuviera saturado a la temperatura del momento.

Isotermas Líneas que unen puntos de igual temperatura.

Isovetas

Remoción en masa Desplazamiento por gravedad de la capa de suelos en forma regional

Líneas que unen puntos de igual precipitación.

25 FL subrayado es nuestro

RIBLIOCRAFIA

Relativo a lo no vivo, estructuras, formaciones, elementos inertes, etc.

Acidez Es el contenido de concentración de iones de hidrógeno en una solución.

Adaptación Un órgano u organismo que se acomoda a las condiciones ambientales en especial a las adversas.

Ambiente Término actualmente más restringido a la genética que a la ecología, en cierto modo sinónimo de medio y de medio ambiente.

Ciencia y Técnica, Vol IV, Pag, 74-95. Publicación de E consmut negivo el prior es onegó portos neidos. Universidad Ante osigorans

Caducifolio Arboles que pierden las hojas al término de una temporada de crecimiento, también se los denomina deciduas. A Todos La Local Maria de Caducifolio

Dominante Especie vegetal más característica de una comunidad (bosque).

Ecología Disciplina biológica que estudia los seres vivos en su último nivel de integración.

Ecosistema Es la noción nuclear de la ecología moderna, hasta llegar a definirse como "la biología de los ecosistemas".

1985 Ecologia Humana; Salvat Editores, S.A.-Barcelona, CENT. atatisaraq nis arto andos aviv any atnal CONY MEJORA athird

Escarda Extirpación de las malas hierbas de una plantación joven.

Escorrentía Aguas pluviales que corren superficialmente en lugar de infiltrarse.

Especie Unidad elemental de clasificación sistemática y taxonómica de los seres vivos.

Factor Limitante Factor ecológico que juega un papel limitante cuando se encuentra ausente o reducido por debajo de un mínimo crítico

Flora FOOT OFFICOMPOSICIÓN cualitativa de la vegetación de una zona determinada.

Formación AIVII Comprende ecosistemas de igual estructura. ON IN SEL SALVADOR, DORO DO ORGEN AS AIVII COMPRENDE ESTRUCTURA DE SALVADOR DE COMPRENDE ESTRUCTURA.

Hábitat Conjunto de condiciones naturales que inciden sobre una especie, y el lugar mismo en que vive dicha especie.

Paísaje Parte fácilmente perceptible de un sistema de relaciones subyacentes,

Pedogénesis Origen y evolución del suelo.

Abiótico

Taxonomía Bornaldo Maria Estudio de la clasificación de los seres vivos conforme a sus semejanzas y diferencias.

Estudio de Recursos Naturales e Información Básica del Chaco Chuquisaqueño, Tomo III, SUCRE-BOLIVIA

1991 Generalidades, Métodos y Procedimientos, Complejos de Tierra, Tomo I, Depto. de Recursos Naturales.
SUCRE, EDITIVIA

(991 Clima, Hidrograffa, Hidrología, Hidrogeología, Tomo II, Dpto. Recursos Naturales, SUCRE - BOLIVIA.

1991 Geología, Geomorfología, Tomo III, Depto. Recursos Naturales, SUCRE - BOLIVIA.

1991 Edafología, Riceos, Tomo IV, Dpto. Recursos naturales, SUCRE - BOLIVIA.

1991 Vegetación y Uso Actual de la Tierra, Tomo V. Doto. Recursos Naturales, SUCRE - BOLIVIA.

1993 Plan de Desarrollo Subregión V. Diagnóstico Evaluativo de la Conformación Subregional, Documento de Trabajo N° 2, Doto, Planes y Estrategias, SUCRE - BOLLVIA.

1992 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley Nº 1333, Medio Ambiente, LA PAZ - BOLIVIA.

JOAQUIN, Nelson

Resultados Preliminares de Producción Forrajera de un Pastizal Chaqueño Bajo Tres Sistemas de Manejo. CIMBOC sefecha

KEMPFE, M. Noel

1985 Aves de Bolivia, Editorial Gisbert y Cfa. S.A. LA PAZ - BOLIVIA.

#### **BIBLIOGRAFIA**

#### CORO, Martiniano

1990 Regiones Fitogeográficas y Ecológicas de las Serranías Subandinas cubiertas de vegetación; Revista de Ciencia y Técnica, Vol IV, Pag, 74-95. Publicación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho; TARIJA.

## CAMPBELL, Bernard

- 1985 <u>Ecología Humana</u>; Salvat Editores, S.A.-Barcelona. CENTRO DE INVESTIGACION Y MEJORA DEL GANADO BOVINO CRIOLLO (CIMBOC).
- 1992 Informe de Actividades y Logros Gestión 1.992, El Salvador CHUQUISACA.
- 1993 <u>Relevamiento de Fauna Silvestre del CIMBOC</u>, Informe Preliminar Campaña Otoño 1993; EL SALVADOR, Dpto. de Chuquisaca, Prov. Luis Calvo, Cantón Carandaytí, BOLIVIA.

# CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO DE CHUQUISACA

<u>Diagnóstico Agropecuario</u>, <u>Zona Influencia</u>, P.D.A.M., Proyecto de Desarrollo Agropecuario de Macharetí, FAO/PNUD BOL 86-033.

Estudio de Recursos Naturales e Información Básica del Chaco Chuquisaqueño, Tomo III, SUCRE-BOLIVIA.

- 1991 <u>Generalidades, Métodos y Procedimientos, Complejos de Tierra,</u> Tomo I, Depto. de Recursos Naturales. SUCRE BOLIVIA.
- 1991 <u>Clima, Hidrografía, Hidrología, Hidrogeología, Tomo II, Dpto. Recursos Naturales, SUCRE BOLIVIA.</u>
- 1991 Geología, Geomorfología, Tomo III, Depto. Recursos Naturales, SUCRE BOLIVIA.
- 1991 Edafología, Riegos, Tomo IV, Dpto. Recursos naturales, SUCRE BOLIVIA.
- 1991 <u>Vegetación y Uso Actual de la Tierra,</u> Tomo V, Dpto. Recursos Naturales, SUCRE BOLIVIA.
- 1993 <u>Plan de Desarrollo Subregión V</u>, Diagnóstico Evaluativo de la Conformación Subregional, Documento de Trabajo Nº 2, Dpto. Planes y Estrategias, SUCRE - BOLIVIA.
- 1992 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley Nº 1333, Medio Ambiente, LA PAZ BOLIVIA.

## JOAQUIN, Nelson

Resultados Preliminares de Producción Forrajera de un Pastizal Chaqueño Bajo Tres Sistemas de Manejo. CIMBOC s/fecha.

#### KEMPFF, M. Noel

1985 Aves de Bolivia, Editorial Gisbert y Cía. S.A. LA PAZ - BOLIVIA.

1986 Impacto del Desarrollo en la Ecología del Trópico Boliviano, JORNADAS SANTA CRUZ 2.000, SANTA CRUZ - BOLIVIA-BOLI

# MINISTERIO DA AGRICULTURA - MA, EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRADA.

1986 <u>Anais do 1º Simposio sobre Recursos Naturais e Socio-Económicos do Pantanal</u>, Departamento de Difusao de Tecnologia, BRASILIA, DF.

# MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS, CENTRO DE DESARROLLO FORESTAL- MISION FORESTAL ALEMANA

- 1978 Proyecto de Planificación Forestal, Plan de Desarrollo del Sector Forestal en Bolivia, 1978 1990; LA PAZ BOLIVIA.
- 1975 Mapa Ecológico de Bolivia, Memoria explicativa; LA PAZ BOLIVIA.
- 1986 <u>Ley General Forestal, Su Reglamento y Ley de Vida Silvestre, Parques nacionales, Caza y Pesca;</u> SANTA CRUZ BOLIVIA.

# MISION BRITANICA, CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL

1980 El Proyecto Criollo Chaqueño, Documento de Trabajo Nº 10, EL SALVADOR - CHUQUISACA.

## MORALES, Cecile

1990 Bolivia Medio Ambiente y Ecología Aplicada, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, BOLIVIA.

#### PARRA, Fernando

1984 Diccionario de Ecología, Ecologismo y medio Ambiente; Alianza Editorial; MADRID.

#### RENOLFI, Rodolfo F.

1990 Red de Cooperación Técnica en uso de los Recursos naturales en la Región Chaqueña Semiárida, Argen tina - Bolivia - Paraguay, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santiago - CHILE.

#### WILKINS, J. V y ROJAS F.

1990 <u>Manual de Actividades y Desarrollo del Proyecto Criollo Chaqueño de CIMBOC</u>; EL SALVADOR - CHUQUISACA.

#### TOLEDO, Saravia Carlos

<u>Guía Preliminar de Recursos Forrajeros-Arbóreos de la Región Chaqueña Semiárida</u>, Centro de Investigaciones Ecológicas del Chaco, SALTA - ARGENTINA.

Impacto del Desarrollo en la Ecología del Trópico Boliviano, JORNADAS SANTA CRUZ 2.000, SANTA

1956 Maderas y Bosques Argentinos, Editorial ACME, SACI - BUENOS AIRES - ARGENTINA.

# YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS - ENDE UTJUDIADA ACIONATERIAM

Estudio del Impacto Ambiental para la construcción del Gasoducto Santa Cruz - Puerto Suárez y Central Termoeléctrica Puerto Suárez, CUMAT, (Pag, 29-36) LA PAZ - BOLIVIA. ROGINIZA DE REPORTE DE REPOR

# MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS, CENTRO DE DESARROLLO FOR-

1978 Proyecto de Planificación Forestal. Plan de Desarrollo del Sector Forestal en Bolivia, 1978 - 1990; LA PAZ - BOLIVIA.

1975 Mana Beológico de Bolivia, Memoria explicativa; LA PAZ - BOLIVIA.

1986 Lev General Forestal, Su Reglamento y Ley de Vida Silvestre, Parques nacionales, Caza y Pesca; SANTA CRITZ - BOLIVIA

# MISION BRITANICA, CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL

1980 El Proyecto Criollo Chaqueño, Documento de Trahajo Nº 10, EL SALVADOR - CHUQUISACA.

## MORALES. Cecile

1990 <u>Bolivia Medio Ambiente y Ecología Aplicada</u>, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, BOLIVIA.

#### PARRA, Fernando

1984 Diccionario de Ecología. Ecologíamo y medio Ambiente: Alianza Editorial: MADRID.

#### REMOLEL Rodolfo E.

1990 Red de Cooperación Técnica en uso de los Recursos naturales en la Región Chaqueña Semiárida, Argen tina - Bolivia - Paraguay, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santiago - CHILE.

#### WILKINS, J. V v ROJAS F.

1990 Manual de Actividades y Desarrollo del Proyecto Criollo Chaqueño de CIMBOC: EL SALVADOR CHUOUISACA:

#### TOLEDO. Saravia Carlos

Guía Preliminar de Recursos Forrajeros-Arbóreos de la Región Chaqueña Semiárida, Centro de Investigaciones Ecológicas del Chaco, SALTA - ARGENTINA.



# **DISE - CHACO**

# COMPLEJOS DE TIERRA DEL AREA DE ESTUDIO

Fuente: Depto. RR. NN. CORDECH. and a legic of the long of the control of the legic of the legic

4.4.1. Riegos.

65

COMPLEJOS DE TIERRA	CLIMA	ALTURA M.S.R.M. (RANGO)	P.P (mm.)	TEMP. C°	PENDIENTES (MAYORES)
IPEPUCO	0	660- 800	700	23	25°-35°
ITANGUA	C1	1.180-1.500	700	23	38°-42°
ITAPU	ci	1.180-1.500	800	19	75°-85°
ITATIQUE	i c	1.320-1.690	900-1.000	22	30°-32°
MILAGROS	C2	1.122-1.570	900- 800	21-22	36°-40°
ARROZAL	Ci	660- 780	800	23	30°-35°
CAMPO LEON	D	850- 875	750	23	6°-8
CAPIRENDA	C1	828- 880	800	23	25°-28°
CARANDAYTI	0	700- 750	600	23-24	9°-11°
RANCAROINZA	C1	720- 755	700- 800	23	10°-12°
SALVADOR	Ci	700- 900	600	23	35°-38°
TIGUIPA	C1	550- 590	700- 750	23	0.5*-2
ACHUMAL	0	445	500	24	0.5°-2
ALGODONAL	0	400- 470	500- 550	24	00-1.50
CARADA	0	380- 450	500- 550	24	0°-1.5°
LAS MORAS	0	425- 510	550- 650	24	0°-3.5°
POSADA	0	435- 505	500- 600	24	0*-1
SANTA FE	0	455- 590	550	24	0.50-1
WIRAPITINDI	0	415- 557	550- 650	24	0*-1
HITO VILLAZON	D-A	365- 440	400- 500	24	0.5*-4
LA ROSA	D-A	360- 455	500	24	03
VUELTA GRANDE	C1	540- 580	600	23-24	35°-40°
PINOTE	C1-D	660- 663	550- 650	24	0°-1.5°
URUCURENDA	C2	710-1.050	850- 900	22 25	0.50-20
ESTACION	C1	490- 575	750	25	100-110
IGUIPINTA	C2	1.150-1.190	850-1.000	22	30°-45°
AGUARAG0E	C2	1.150-1.450	850- 950	23	240-28
CARURUTI	CI	1.120-1.370	700	23	30°-43°
HUACAYA	0	975-1.270	800- 850	23	384-40
PALACIOS	C2	850-1.165 575- 620	700- 850	23	0*-0.5
MACHARETI			700- 800	23	37°-41
CUEVO BOYUIBE	0	778- 785	800	23	0.5°-3

## CLIMA:

C2 = Subhúmedo - húmedo = Subhúmedo

= Subhúmedo - seco

= Transición entre subhúmedo-seco y semiárido

= Semiárido

C1-D 00 D

C

C1

D-A = Semiárido a árido

# ANEXO.

# Indice

DISE - CHACO

ONTENIDO TRODUCCIÓN.	MP. C* PENDIENTES (NAYORES)	P.P (us.) 9.4	ALTURA 0.7.0.0 (BAN90)	61(1)(6)	COMPLESOS DE TIERRA	
bjetivos específicos. letodología.	20 25"-32" 20 30"-62" 21 75"-62" 22 30"-72" 21-22 36"-60"				O SUPERIOR	
bicación y extensión d					HILAGROS H ARROIAL H CAMPO LEON	
3.1. Ubicación geog						
3.2. Extensión.	186-186 25					
3.3. Límites.	24 0.5"-2"		465 400 - 470			
3.4. División Polític	co-Administrativa.					
	1-1-10					
Descripción General.	14-15-0		265- 557 265- 660 260- 465			
4.1. Geología.	22-24 35'-46' 1					
	nes Estratigráficas.					
4.1.2. Estructura					IGUIPINTA AGUARAGOE	
4.1.3. Fallas Geo	II TO LAND LAND					
4.1.4. Movimier						
4.1.5. Recursos						
4.2. Geomorfología		Fair Cut WO	TOTAL	MUN ALEX		
4.2.1. Sistema C	Geomorfológico de la	raja Subandina	adatos i		roadact : amang	
	Geomorfológico del ár					
4.2.3. Sistema C	Geomorfológico de la	Lianura Chaque	ena			
4.3. Hidrografía.						
4.5. Indiograna.						
4.4 Hidrología						
4.4. Hidrología.						
4.4. Hidrología. 4.4.1. Riegos.						
4.4.1. Riegos.						
4.4.1. Riegos. 4.5. Clima. 21	náticos.					
4.4.1. Riegos.	máticos.					
4.4.1. Riegos. 4.5. Clima. 21	máticos.					
<ul><li>4.4.1. Riegos.</li><li>4.5. Clima. 21</li><li>4.5.1. Tipos Clir</li><li>4.6. Suelos.</li></ul>						
<ul><li>4.4.1. Riegos.</li><li>4.5. Clima. 21</li><li>4.5.1. Tipos Clir</li></ul>						
<ul> <li>4.4.1. Riegos.</li> <li>4.5. Clima. 21</li> <li>4.5.1. Tipos Clin</li> <li>4.6. Suelos.</li> <li>4.7. Vegetación y us</li> <li>4.7.1. Fauna.</li> </ul>	so actual del suelo.					
<ul> <li>4.4.1. Riegos.</li> <li>4.5. Clima. 21</li> <li>4.5.1. Tipos Clir</li> <li>4.6. Suelos.</li> <li>4.7. Vegetación y us 4.7.1. Fauna.</li> <li>4.8. Areas de uso ac</li> </ul>	so actual del suelo. ctual del suelo y poter		compatibles	con el me	medo - seco ción entre subhúmedo- rido a árido	
<ul> <li>4.4.1. Riegos.</li> <li>4.5. Clima. 21     <ul> <li>4.5.1. Tipos Clir</li> </ul> </li> <li>4.6. Suelos.</li> <li>4.7. Vegetación y us     <ul> <li>4.7.1. Fauna.</li> </ul> </li> <li>4.8. Areas de uso ac     <ul> <li>4.8.1. Areas de uso ac</li> </ul> </li> </ul>	so actual del suelo. ctual del suelo y poter uso actual y potencial	similares y con	compatibles	con el me	medo - seco ción entre subhúmedo- rido a árido	
<ul> <li>4.4.1. Riegos.</li> <li>4.5. Clima. 21</li> <li>4.5.1. Tipos Clin</li> <li>4.6. Suelos.</li> <li>4.7. Vegetación y us</li> <li>4.7.1. Fauna.</li> <li>4.8. Areas de uso ac</li> <li>4.8.1. Areas de u</li> <li>4.8.2. Areas de u</li> </ul>	so actual del suelo. ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial	similares y con disímiles.	compatibles apatibles con	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
<ul> <li>4.4.1. Riegos.</li> <li>4.5. Clima. 21     <ul> <li>4.5.1. Tipos Clin</li> </ul> </li> <li>4.6. Suelos.</li> <li>4.7. Vegetación y us     <ul> <li>4.7.1. Fauna.</li> </ul> </li> <li>4.8. Areas de uso ac     <ul> <li>4.8.1. Areas de uso ac</li> <li>4.8.2. Areas de uso ac</li> <li>4.8.3 Areas de ri</li> </ul> </li> </ul>	so actual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que	similares y con disímiles.	compatibles apatibles con	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
<ul> <li>4.4.1. Riegos.</li> <li>4.5. Clima. 21</li> <li>4.5.1. Tipos Clin</li> <li>4.6. Suelos.</li> <li>4.7. Vegetación y us</li> <li>4.7.1. Fauna.</li> <li>4.8. Areas de uso ac</li> <li>4.8.1. Areas de u</li> <li>4.8.2. Areas de u</li> <li>4.8.3 Areas de ri</li> </ul>	so actual del suelo. ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial	similares y con disímiles.	compatibles apatibles con	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
<ul> <li>4.4.1. Riegos.</li> <li>4.5. Clima. 21     <ul> <li>4.5.1. Tipos Clir</li> </ul> </li> <li>4.6. Suelos.</li> <li>4.7. Vegetación y us     <ul> <li>4.7.1. Fauna.</li> </ul> </li> <li>4.8. Areas de uso ac     <ul> <li>4.8.1. Areas de uso ac</li> <li>4.8.2. Areas de uso ac</li> <li>4.8.3 Areas de ri     <ul> <li>infraestruc</li> </ul> </li> </ul></li></ul>	ctual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que ctura física u otros.	similares y con disímiles. restringen o imp	compatibles apatibles con posibilitan la	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
4.4.1. Riegos.  4.5. Clima. 21 4.5.1. Tipos Clir  4.6. Suelos. 4.7. Vegetación y us 4.7.1. Fauna.  4.8. Areas de uso ac 4.8.1. Areas de uso ac 4.8.2. Areas de uso ac 4.8.3 Areas de ri infraestruc  6íntesis de las principale	ctual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que ctura física u otros.	similares y con disímiles. restringen o imp tencialidades ar	compatibles apatibles con posibilitan la	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
4.4.1. Riegos.  4.5. Clima. 21 4.5.1. Tipos Clir  4.6. Suelos. 4.7. Vegetación y us 4.7.1. Fauna.  4.8. Areas de uso ac 4.8.1. Areas de us 4.8.2. Areas de us 4.8.3 Areas de ri infraestruc  íntesis de las principale 5.1. Desarticulación	ctual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que ctura física u otros.  es problemáticas y po n interna por caracterí	similares y con disímiles. restringen o imp tencialidades ar sticas naturales	compatibles apatibles con posibilitan la	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
4.4.1. Riegos.  4.5. Clima. 21 4.5.1. Tipos Clir  4.6. Suelos. 4.7. Vegetación y us 4.7.1. Fauna.  4.8. Areas de uso ac 4.8.1. Areas de us 4.8.2. Areas de us 4.8.3 Areas de ri infraestruc  íntesis de las principale 5.1. Desarticulación 5.2 Relación del me	ctual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que ctura física u otros.  es problemáticas y po n interna por caracterí edio natural y poblacie	similares y con disímiles. restringen o imp tencialidades ar sticas naturales ón.	compatibles apatibles con posibilitan la	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
4.4.1. Riegos.  4.5. Clima. 21 4.5.1. Tipos Clir  4.6. Suelos. 4.7. Vegetación y us 4.7.1. Fauna.  4.8. Areas de uso ac 4.8.1. Areas de us 4.8.2. Areas de us 4.8.3 Areas de ri infraestruc  íntesis de las principale 5.1. Desarticulación 5.2 Relación del me 5.3 Uso del territori	ctual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que ctura física u otros.  es problemáticas y po n interna por caracterí edio natural y poblacio o y sus potencialidad	similares y con disímiles. restringen o imp tencialidades ar sticas naturales ón.	compatibles apatibles con posibilitan la	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
4.4.1. Riegos.  4.5. Clima. 21 4.5.1. Tipos Clir  4.6. Suelos. 4.7. Vegetación y us 4.7.1. Fauna.  4.8. Areas de uso ac 4.8.1. Areas de us 4.8.2. Areas de us 4.8.3 Areas de ri infraestruc  íntesis de las principale 5.1. Desarticulación 5.2 Relación del me 5.3 Uso del territori 5.3.1. Areas no	ctual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que ctura física u otros.  es problemáticas y po n interna por caracterí edio natural y poblaci io y sus potencialidad utilizables.	similares y con disímiles. restringen o imp tencialidades ar sticas naturales ón. es.	compatibles apatibles con posibilitan la	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
4.4.1. Riegos.  4.5. Clima. 21 4.5.1. Tipos Clir  4.6. Suelos. 4.7. Vegetación y us 4.7.1. Fauna.  4.8. Areas de uso ac 4.8.1. Areas de us 4.8.2. Areas de us 4.8.3 Areas de ri infraestruc  íntesis de las principale 5.1. Desarticulación 5.2 Relación del me 5.3 Uso del territori 5.3.1. Areas no	ctual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que ctura física u otros.  es problemáticas y po n interna por caracterí edio natural y poblacio o y sus potencialidad	similares y con disímiles. restringen o imp tencialidades ar sticas naturales ón. es.	compatibles apatibles con posibilitan la	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
4.4.1. Riegos.  4.5. Clima. 21 4.5.1. Tipos Clin  4.6. Suelos. 4.7. Vegetación y us 4.7.1. Fauna.  4.8. Areas de uso ac 4.8.1. Areas de us 4.8.2. Areas de us 4.8.3 Areas de ri infraestruc  Síntesis de las principale 5.1. Desarticulación 5.2 Relación del me 5.3 Uso del territori 5.3.1. Areas no us	ctual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que ctura física u otros.  es problemáticas y po n interna por caracterí edio natural y poblacio o y sus potencialidad utilizables. iles de aprovechamie	similares y con disímiles. restringen o imp tencialidades ar sticas naturales ón. es.	compatibles apatibles con posibilitan la	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
4.4.1. Riegos.  4.5. Clima. 21 4.5.1. Tipos Clin 4.6. Suelos. 4.7. Vegetación y us 4.7.1. Fauna.  4.8. Areas de uso ac 4.8.1. Areas de us 4.8.2. Areas de us 4.8.3 Areas de ri infraestruc  intesis de las principale 5.1. Desarticulación 5.2 Relación del me 5.3 Uso del territori 5.3.1. Areas no us 5.3.2 Areas frág  5.4 Legislación amb	ctual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que ctura física u otros.  es problemáticas y po n interna por caracterí edio natural y poblaci no y sus potencialidad utilizables. iles de aprovechamies	similares y con disímiles. restringen o imp tencialidades ar sticas naturales ón. es.	compatibles apatibles con posibilitan la	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
4.4.1. Riegos.  4.5. Clima. 21 4.5.1. Tipos Clir  4.6. Suelos. 4.7. Vegetación y us 4.7.1. Fauna.  4.8. Areas de uso ac 4.8.1. Areas de us 4.8.2. Areas de us 4.8.3 Areas de ri infraestruc  atesis de las principale 5.1. Desarticulación 5.2 Relación del me 5.3 Uso del territori 5.3.1. Areas no us 5.3.2 Areas frág  5.4 Legislación amb	ctual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que ctura física u otros.  es problemáticas y po n interna por caracterí edio natural y poblaci no y sus potencialidad utilizables. iles de aprovechamies	similares y con disímiles. restringen o imp tencialidades ar sticas naturales ón. es.	compatibles apatibles con posibilitan la	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	
4.4.1. Riegos.  4.5. Clima. 21 4.5.1. Tipos Clir  4.6. Suelos. 4.7. Vegetación y us 4.7.1. Fauna.  4.8. Areas de uso ac 4.8.1. Areas de us 4.8.2. Areas de us 4.8.3 Areas de ri infraestruc  intesis de las principale 5.1. Desarticulación 5.2 Relación del me 5.3 Uso del territori 5.3.1. Areas no us 5.3.2 Areas frág	ctual del suelo.  ctual del suelo y poter uso actual y potencial uso actual y potencial uso actual y potencial iesgo y amenaza que ctura física u otros.  es problemáticas y po n interna por caracterí edio natural y poblaci no y sus potencialidad utilizables. iles de aprovechamies	similares y con disímiles. restringen o imp tencialidades ar sticas naturales ón. es.	compatibles apatibles con posibilitan la	con el me el medio a	ción entre subhúmedo- rido a árido dio ambiente ambiente	

# Indice de Cuadros

CUADRO N° 1DISE - CHACO DIVISION GEOPOLITICA	7
CUADRO N° 2DISE - CHACO COLUMNA ESTRATIGRAFICA GENERALIZADA EN EL AREA DE ESTUDIO	9
CUADRO N° 3DISE - CHACO SISTEMAS GEOMORFOLOGICOS	13
CUADRO Nº 4DISE - CHACO CUENCAS HIDROGRAFICAS	16
CUADRO N° 5DISE - CHACO ESTIMACION DE MAXIMOS CAUDALES DE LA CUENCA DE LAS	
CUENCAS DEL AREA DE ESTUDIO	19
CUADRO Nº 6DISE - CHACO AREAS CON POSIBILIDADES DE RIEGO Y VOLUMEN MEDIO	
ANUAL APROVECHABLE PARA CADA CUENCA	20
CUADRO Nº 7DISE - CHACO ESTACIONES CLIMATOLOGICAS	21
CUADRO Nº 8DISE - CHACO NUEVA RED DE ESTACIONES METEREOLOGICAS	22
DE LA PROVINCIA LUIS CALVO CUADRO Nº 9DISE - CHACO CLASIFICACION POR CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS	32
DEL AREA DE ESTUDIO	41
CUADRO Nº 10DISE - CHACO INTENSIDAD DE CARGA ANIMAL POR CANTONES	41
CUADRO Nº 11DISE - CHACO SUPERFICIE CULTIVADA POR CANTONES	50
CUADRO Nº 12DISE - CHACO CONSUMO DE LEÑA POR CANTONES	50
Indice de Mapas	
MAPA 1 UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO	6
MAPA 2 DIVISION POLITICA Y SUPERFICIE	8
MAPA 3 SISTEMAS Y UNIDADESGEOMORFOLOGICAS	12
MAPA 4 HIDROGRAFIA Y POTENCIAL DE RIEGO MAPA 5 CLIMATICO	17
MAPA 6 SUELOS	31 35
MAPA 7 USO ACTUAL DEL SUELO	48
MAPA 8 POTENCIAL DE SUELOS	53
MAN TOTENCIAL DI SOLLOS	33
Indice de Gráficos	
GRAFICO 1 SUBANDINOBALANCE HIDRICO MUTYPAMPA	23
GRAFICO 2 PIE DE MONTE BALANCE HIDRICO MACHARETI	24
GRAFICO 3 PIE DE MONTE BALANCE HIDRICO EL SALVADOR	25
GRAFICO 4 BALANCE HIDRICO CARANDAYTI	26
GRAFICO 5 SUBANDINO DIAGRAMA AGROCLIMATICO MUYUPAMPA	27
GRAFICO 6 PIE DE MONTE DIAGRAMA AGROCLIMATICOEL SALVADOR	28
GRAFICO 7 PIE DE MONTE DIAGRAMA AGROCLIMATICO MACHARETI	29
GRAFICO 8 LLANURA CHAQUEÑA DIAGRAMA AGROCLIMATICO CARANDAYTI	30
Indice de Anexo	

65

CUADRO Nº 1DISE - CHACO COMPLEJOS DE TIERRA DEL ARE A DE ESTUDIO

# Indice de Cuadros

7	IDISE - CHACO DIVISION GEOPOLITICA	CUADRON
	2DISE - CHACO COLUMNA ESTRATIGRAFICA GENERALIZADA EN EL AREA DE ESTUDIO	CUADRO Nº
13	3DISE - CHACO SISTEMAS GEOMORPOLOGICOS	CUADRO Nº
16	4DISE - CHACO CUENCAS HIDROGRAFICAS	CUADRON
	SDISE - CHACO ESTIMACION DE MAXIMOS CAUDALES DE LA CUENCA DE LAS	CUADRO Nº
	CUENCAS DEL AREA DE ESTUDIO	
	6DISE - CHACO AREAS CON POSIBILIDADES DE RIEGO Y VOLUMEN MEDIO	CUADRO Nº
20	ANUAL APROVECHABLE PARA CADA CUENCA	
21	7DISE - CHACO ESTACIONES CILIMATOLOGICAS	CUADRO Nº
	8DISE - CHACO NUEVA RED DE ESTACIONES METEREOLOGICAS	CUADRO Nº
	DE LA PROVINCIA LUIS CALVO	
	9DISE - CHACO CLASIFICACION POR CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS :	CUADRO Nº
	IÓDISE - CHACO INTENSIDAD DE CARGA ANIMAL POR CANTONES	CUADRO Nº.
	HDISE - CHACO SUPERFICIE CULTIVADA POR CANTONES	CUADROW
	12DISE - CHACO CONSUMO DE LEÑA POR CANTONES	CUADRO Nº

# Indice de Mapas

UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO	1	MAPA
DIVISION POLITICA Y SUPERFICIE		MAPA
SISTEMAS Y UNIDADESGEOMORFOLOGICAS		MAPA
HIDROGRAFIA Y POTENCIAL DE RIEGO	4	MAPA
CLIMATICO	5	MAPA
SUELOS	6	MAPA
USO ACTUAL DEL SUELO	7	MAPA
DOMESTICIAL DE CITEL OS	8	MARAPA

# Indice de Gráficos

SUBANDINOBALANCE HIDRICO MUTYPAMPA	GRAFICO I
PIE DE MONTE BALANCE HIDRICO MACHARIETI	<b>GRAFICO 2</b>
PIE DE MONTE BALANCE HIDRICO EL SALVADOR	GRAFICO 3
BALANCE HIDRICO CARANDAYTI	GRAFICO 4
SUBANDINO DIAGRAMA AGROCLIMATICO MUYUPAMPA	GRAFICO 5
PIE DE MONTE DIAGRAMA AGROC'I IMÀTICOEL SALVADOR	GRAFICO 6
PIE DE MONTE DIAGRAMA AGROCI.IMATICO MACHARETI	
LLANURA CHAQUEÑA DIAGRAMA AGROCLIMATICO CARANDAYTI	GRAFICO 8

# Indice de Anexo

CUADRO Nº IDISE - CHACO COMPLEJOS DE TIERRA DEL ARE A DE ESTUDIO



